

1.0 cm

32.0 cm

0.8 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: TRIAZINAS
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, si existe respiración con dificultad, practicar respiración artificial.
- No dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

Antídoto: No existe antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ATRAPLUS 500 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Atrazina 500 g/l
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 980 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita - Lima 43

Teléfono: 478-2001 Fax: 362-0014

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD

30/F, Golden Center Tower N° 3037

Jintian Road CBD Futian, Shenzhen

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido neto: 200 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ATRAPLUS 500 SC es un herbicida sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

Aplicar ATRAPLUS 500 SC mediante pulverizaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, para lo cual se debe agregar al tanque de aspersión agua hasta la mitad y luego la dosis recomendada del producto, agitándolo continuamente con el volumen completo de agua, hasta que el producto este bien disuelto

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L /Ha	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5	7	0.1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia pepus</i>			

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar ATRAPLUS 500 SC desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura. Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: ATRAPLUS 500 SC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

COMPATIBILIDAD: ATRAPLUS 500 SC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



15.0 cm

2.2 cm