

Presentación x 500 grs:
18.5 cm x 24.5 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Organophosphate

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 0801-10200
CAISAC: 01-253 - 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas.
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fréaticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOREAL 80 WP, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo para el tratamiento de enfermedades producidas por hongos Oomicetes. Estimula los medios naturales de defensa de la planta.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

BOREAL 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

BOREAL 80 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Fresa	Tristeza	<i>Phytophthora citrophthora</i>	0,5	14	75
Páprika	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	0,5 - 1,0	15	0,05
Palto	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0,5	14	50

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos

® Marca registrada



BOREAL[®] 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Fosetyl-Aluminium800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 981-SENASA

Titular de Registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio del PARK II. Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Room 3101, West tower, Fortune international building,
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.
Telf.: + 86 – 25- 84653194
Fax: + 86-25-84658312/3123

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
Contenido Neto: 500g

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**