

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir, evite el contacto con la piel y la ropa, contiene materiales moderadamente tóxicos.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Quinazoline.
- En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación: Retirar al afectado de la zona de exposición. Mover a la persona al aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. Llamar al médico para tratamiento.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuague con bastante agua por 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto si usa. Llamar al médico para tratamiento.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico para tratamiento.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito a menos que el médico lo indique. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 117 ó 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- "Altamente peligroso para abejas".
- "No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
- "Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes". "Evitar la deriva por el viento".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Stiletto®

20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fenazaquin.....200 g/L
Aditivos.....C.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 988 - SENASA



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Titular del Registro, importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Teléfono (86-510) 8785 1001
Fax 8785 1537

Contenido Neto: **1 L**
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

STILETTO 20 SC, es un acaricida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad en insectos móviles y efecto ovicida. En ácaros previene la eclosión de huevos y controla todos sus estados: huevos, ninfas y adultos. Es un inhibidor del transporte de electrones mitocondrial. No tiene efecto sistémico en la planta.

STILETTO 20 SC, se emplea diluido en agua limpia. Primero se prepara una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego se procede a vaciarlo al tanque de aplicación. Completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

STILETTO 20 SC, puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas al tractor, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/cil (200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	100 - 200	28	0.5
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	100	49	0.01
Arroz	Acaro de la vaina	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	150 - 175	35	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). P.C.: Período de Carenia en días.
N.D.: No determinado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar al detectar la presencia de la plaga en las hojas. No aplicar a intervalos menores a 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada si usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

STILETTO 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

