21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este productopuede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc.).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, utilizar protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.

PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 08001 - 3040 **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases Vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.

VERMEKILL 18 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Abamectin .....18 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 992 - SENASA
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC
Importado y distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING SAC

Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD
30/F, Golden Center Tower N° 3037
Jintia Road CBD Futian, Shenzhen
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
VERMEKILL 18 EC es un insecticida- acaricida que actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Mandarina	Acaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.1	0.5	7	0.01
Papa	Mosca minadora	*Liriomyza huidobrensis*	0.2	0.4	14	0.01
Pimiento	Acaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	0.15-0.2	-	7	0.02
Vid	Ácaro	*Colomerus vitis*	0.2	0.6	28	0.01

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.: Límites máximos de residuos**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña /año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa.
No se debe aplicar **VERMEKILL 18EC** en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para las abejas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.