

7.7 cm

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc.).
 - Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
 - Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.

PRIMEROS AUXILIOS:
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 CICOTOX: 08001 - 3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
 - Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para las abejas u artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
 - Peligroso para los organismos acuáticos.



VERMEKILL

18 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
 Abamectin 18 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 992 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.
 Importado y distribuido por:
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita
 Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Fecha de Formulación: Formulado por:
 HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD
 N° de Lote: 30/F, Golden Center Tower N° 3037
 Jintian Road CBD Futian, Shenzhen
Fecha de Vencimiento: CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VERMEKILL 18 EC es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta. VERMEKILL 18 EC actúa sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, manifiesta efecto secundario en hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Mandarina	"Ácaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.1	0.5	7	0.01
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	0.4	14	0.01
Pimiento	"Ácaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.15-0.2	0.3-0.4	7	0.02
Vid	"Ácaro"	<i>Colomerus vitis</i>	0.2	-	28	0.01
Palto	"Ácaro"	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2	-	14	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



1.20 cm