

28.5 cm

1 cm

0.8 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, utilizar protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol, botas de goma, gafas y respirador con filtros para solventes orgánicos) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Glicósidos Lactone Macrocíclicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de fortalecimiento.

CICOTOX: 08001-3040 TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CROP BUSINESS SAC: (01) 349 2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

VERMEKILL  
18 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:  
Abamectin ..... 18 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 992 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:  
N° de Lote: NANJING RHONQUIM CO., LTD  
Contenido Neto: 1 L N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009  
Fecha de Vencimiento: CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERMEKILL 18 EC es un insecticida-acaricida utilizado para el control de ácaro del tostado, mosca minadora y ácaro hialino, en los cultivos de mandarina, papa y pimiento respectivamente.

VERMEKILL 18 EC actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta.

VERMEKILL 18 EC actúa además sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, también manifiesta un efecto secundario sobre las hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVOS  | PLAGA               |                                  | DOSIS    |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común        | Nombre Técnico                   | L/200 L  | L/Ha    |                |                 |
| Mandarina | "Acaro del tostado" | <i>Phyllocoptruta oleivora</i>   | 0.1      | 0.5     | 7              | 0.01            |
| Papa      | "Mosca minadora"    | <i>Liriomyza huidobrensis</i>    | 0.2      | 0.4     | 14             | 0.01            |
| Pimiento  | "Acaro hialino"     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.15-0.2 | 0.3-0.4 | 7              | 0.02            |
| Vid       | "Acaro"             | <i>Colomerus vitis</i>           | 0.2      | -       | 28             | 0.01            |
| Palto     | "Acaro"             | <i>Oligonychus punicae</i>       | 0.2      | -       | 14             | 0.01            |

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: VERMEKILL 18 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña/año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa. No se debe aplicar VERMEKILL 18 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: VERMEKILL 18 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: VERMEKILL 18 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



NOMBRE COMERCIAL  
NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA  
Banda toxicológica Pantone Yellow  
C:0 M:0 Y:100 K:0

15 cm

2.2 cm