

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 1 LITRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases desocupados se deberá destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS

Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Central de urgencias y emergencias de EsSalud: 117.
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita).
FARMEX S.A.: (01) 630-6400

NOTA AL MEDICO

DL₅₀
 - Oral aguda : > 2000 mg / Kg
 - Dermal Aguda : > 4000 mg / Kg

NO EXPLOSIVO **NO INFLAMABLE** **NO CORROSIVO**

NOTA AL COMPRADOR

"EL vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas".

MAXBIO® TRIHORMONAL

(Citoquininas+Auxinas+Giberelinas)

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición Química:

Ingrediente activo:

Citoquininas (como kinetina)0.132 g/L
 Auxinas.0.050 g/L
 Giberelinas.0.050 g/L
 Aditivosc.s.p.1L

**REGULADOR BIOLOGICO DE CRECIMIENTO
DE USO AGRICOLA**

Reg. PBUA N° 301 – SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.



Formulado y distribuido por:
FARMEX S.A.
 Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
 San Isidro, Lima-Perú.
 Teléfono: 630-6400.

Contenido Neto: 1 Litro
 N° de Lote:
 Fecha de Fab.:
 Fecha de Venc.:

INDICATIVOS DE USO:

MAXBIO®TRIHORMONAL, es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para estimular y restablecer la fisiología normal de la planta dando como resultado el incremento de los rendimientos y mejorando también la calidad de la cosecha. Contiene citoquininas, auxinas y giberelinas; sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos menores quelatizados; indispensables para el óptimo metabolismo de las plantas.

El contenido de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así también como la formación de los frutos. Las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

MAXBIO®TRIHORMONAL, es un concentrado soluble que se disuelve en el agua. Para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo, medir la cantidad recomendada del producto y diluirlo con suficiente cantidad de agua para luego llevarlo al volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse dentro de las doce (12) horas posteriores a su preparación.

USOS ESPECIFICOS

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Pimiento	*0.5 L/Ha.	Aplicar a los 30 días después del transplante en pleno crecimiento. La segunda aplicación a los 30 días después de la primera aplicación.
Alcachofa	0.5 L/200 L	1 ^{era} . Aplicación: 75 días después del transplante, durante el desarrollo vegetativo. 2 ^{da} aplicación: 15 días después de la primera aplicación, previa a la floración o emisión de capítulos. 3 ^{era} . Aplicación: 15 días después de la segunda aplicación, durante la formación de capítulos.

*Gasto mínimo de agua de 200 litros por Hectárea.

COMPATIBILIDAD

MAXBIO®TRIHORMONAL es compatible con la mayoría de plaguicidas y puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de **MAXBIO®TRIHORMONAL** y del otro plaguicida o sustancia afín. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos.

La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

MAXBIO®TRIHORMONAL no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendada.



Manténgase alejado de las
 personas, animales, productos
 alimenticios y medicinas

**LIGERAMENTE TÓXICO
- PRECAUCIÓN -**

Destruya éste envase
 inmediatamente después
 de usar el producto

