

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 250 ml

<p>LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p> <p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 48 horas.</p> <p>PRIMEROS AUXILIOS Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.</p> <p style="text-align: center;">Teléfonos de emergencia: Central de urgencias y emergencias de Es Salud: 117 CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita). FARMEX S.A.: (01) 630-6400</p> <p>NOTA AL MEDICO DL₅₀ - Oral aguda:> 2000 mg / Kg - Dermal Aguda:> 4000 mg / Kg NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE</p>	<p style="text-align: center;">MAXBIO®TRIHORMONAL (Citoquininas+Auxinas+Giberelina)</p> <p style="text-align: center;">CONCENTRADO SOLUBLE - SL</p> <p>Composición Química: Ingrediente activo: Citoquininas (como kinetina).....0.132 g/L Auxinas.....0.050 g/L Giberelinas.....0.050 g/L Aditivos.....c.s.p.....1L</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REGULADOR BIOLÓGICO DE CRECIMIENTO DE USO AGRÍCOLA </div> <p style="text-align: center;">Reg. PBUA N° 301-SENASA</p> <p>Titular del Registro: FARMEX S.A. Formulado y distribuido por: Contenido Neto: 250 ml FARMEX S.A. N° de Lote: Calle Dean Valdivia N° 148, Fecha de Fab.: Piso 7, San Isidro, Lima-Perú. Fecha de Venc.: Teléfono: 630-6400.</p>	<p>USOS ESPECIFICOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cultivo</th> <th style="width: 15%;">Dosis</th> <th style="width: 70%;">Momento de aplicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pimiento</td> <td>*0.5 L/Ha</td> <td>Aplicar a los 30 días después del trasplante. La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera aplicación.</td> </tr> <tr> <td>Alcachofa</td> <td>0.5 L/200L</td> <td>1^{era}. Aplicación: 75 días después del trasplante, durante el desarrollo vegetativo. 2^{da} aplicación: 15 días después de la primera aplicación, previa a la floración o emisión de capítulos. 3^{era}. Aplicación: 15 días después de la segunda aplicación, durante la formación de capítulos.</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Gasto mínimo de agua de 200 litros por hectárea.</p> <p>NOTA AL COMPRADOR "EL vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas".</p>	Cultivo	Dosis	Momento de aplicación	Pimiento	*0.5 L/Ha	Aplicar a los 30 días después del trasplante. La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera aplicación.	Alcachofa	0.5 L/200L	1 ^{era} . Aplicación: 75 días después del trasplante, durante el desarrollo vegetativo. 2 ^{da} aplicación: 15 días después de la primera aplicación, previa a la floración o emisión de capítulos. 3 ^{era} . Aplicación: 15 días después de la segunda aplicación, durante la formación de capítulos.
Cultivo	Dosis	Momento de aplicación									
Pimiento	*0.5 L/Ha	Aplicar a los 30 días después del trasplante. La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera aplicación.									
Alcachofa	0.5 L/200L	1 ^{era} . Aplicación: 75 días después del trasplante, durante el desarrollo vegetativo. 2 ^{da} aplicación: 15 días después de la primera aplicación, previa a la floración o emisión de capítulos. 3 ^{era} . Aplicación: 15 días después de la segunda aplicación, durante la formación de capítulos.									

	Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinas	LIGERAMENTE TÓXICO - PRECAUCIÓN -	Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto	
---	--	--	---	---