

12.0 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

0.5 ± 0.2

# AVALANCH®

## 500 WG

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin .....500 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 418 - SENASA

Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Importado y Distribuido por:

**neoagrum**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

**Contenido neto: 100 g**

N° de Lote:

F. de Form.:

F de Venc.:

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO.,LTD

64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,

Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Estrobirulinas.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

ALO ESSALUD 0801-10200 CICOTOX 0-800-1-3040  
NEOAGRUM (01) 617-6400

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligro para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Evite aplicaren zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Ligeramente Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AVALANCH® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunden en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares.

AVALANCH® 500 WG es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium.

AVALANCH® 500 WG actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelar con un prolongado efecto residual.

AVALANCH® 500 WG se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por hectárea.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña. Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas MIP.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto

**COMPATIBILIDAD**

AVALANCH® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentrados emulsionables.

**FITOTOXICIDAD**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / ha	g/200L		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	80	30	5
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	40-80	30	0.02
Granado	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.10	80	9	0.05
Pimiento Piquillo	Ceniza	<i>Leveillula taurica</i>	0.12 - 0.2	60-100	3	2
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.2	-	14	1

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos



19.0 ± 0.3 cm

2.3 cm