

Etiqueta TRIADIM x 1L

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y causa irritación a la piel.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambíese, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico del producto: Triazol.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

NOTA AL MÉDICO:

No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
CICOTOX TLF.: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y tierra la solución en la mezcla de aplicación y luego muéltelo al tiradero o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no volver en ningún caso, mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase tipo al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estuarios, arroyos o drenajes con restos o sobrantes de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en un sitio designado por las autoridades locales para este fin.



09/04/14

TRIADIM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Triadimenol.....250 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO ANDINA S.A.C.
Calle Los Fresnos N° 440,
Urt. California, Víctor Larco Herrera - Trujillo, PERÚ.



Fabricante y Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
29 F. Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road, Nanjing
China



CONTENIDO NETO:

Numero de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO
TRIADIM, es un fungicida sistémico para tratamientos preventivos, con efecto curativo y erradicante.

TRIADIM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		Período de Cuidado (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	LMa		
PIMENTO	"Oidium"	Leveillula taurica	250 - 300	0.5 - 0.6	10	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carenza.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación/campaña/año.
Se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica del cultivo del pimiento, respetando el período de carencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRIADIM 250 EC, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los agentes oxidantes o sustancias altamente alcalinas (pH >10) o altamente ácidas (pH<3).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".