

29.4 x 15 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y causa irritación a la piel.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar en casa habitación.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico del producto: Triazol.
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión accidental induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al médico:** No hay un antídoto específico.  
En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**  
SAMU: 106      AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# FOLIDAN®

## 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Triadimenol ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1L

PQUA N° 1007 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

**AGREVO PERUANA S.A.C.**  
Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., Ltd.**  
29 F, Soho Mansion, N°8 South Zhongshan Road,  
Nanjing. CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO      INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Folidan** es un fungicida sistémico para tratamientos preventivos, con efecto curativo y erradicante. **Folidan** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	mL/200L	L/Ha		
PIMIENTO	Oidium	Leveillula taurica	250 - 300	05 - 0.6	10	1
ALCACHOFA	Oidium	Leveillula taurica	150	-	5	0.7

LMR: Límite máximo de Residuos.      PC: Período de Carenacia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**Cultivo de pimiento:** Se recomienda realizar una sola aplicación/campaña/año. Se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica, respetando el período de carencia.

**Cultivo de alcachofa:** Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año. En la etapa fenológica de desarrollo de hojas del cultivo, cuando se observen los primeros síntomas y el nivel de la plaga sea leve. El gasto promedio de agua es 300L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**Folidan** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los agentes oxidantes o sustancias altamente alcalinas (pH >10) o altamente ácidas (pH<3).

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

