

## PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 500 mL

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersion.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases vacíos se deberá destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito.  
En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón;  
Los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

**Central de urgencias y emergencias de EsSalud: 117.**  
**CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita).**  
**FARMEX S.A.: (01) 630-6400**

**NOTA AL MEDICO**

DL<sub>50</sub>

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| - Oral aguda   | : | > 2000 mg / Kg |
| - Dermal Aguda | : | > 2000 mg / Kg |

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO  
NO INFLAMABLE

**NOTA AL COMPRADOR**

"El titular del registro garantiza que las características del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

**MAXBIO®**  
**KELP**

**(Citoquininas+Auxinas)**

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

### Composición Química:

**Ingrediente activo:**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Citoquininas (como kinetina) ..... | 0.132 g/L      |
| Auxinas .....                      | 0.050 g/L      |
| Aditivos .....                     | c.s.p. .... 1L |

**REGULADOR BIOLOGICO DE CRECIMIENTO  
DE USO AGRICOLA**

**Reg. PBUA N° xxx – SENASA**

Titular del Registro:  
**FARMEX S.A.**



Formulado y distribuido por:

**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,  
San Isidro, Lima-Perú.  
Teléfono: 630-6400.

**CONTENIDO NETO: 500 mL**

Nº de Lote:  
 Fecha de Fab.:  
 Fecha de Venc.:

**INDICACIONES DE USO:**

**MAXBIO®KELP**, es un producto con alto contenido de citoquinina y auxina. Es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas. Contiene citoquininas mas auxinas sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos menores quelatizados; indispensables para el óptimo metabolismo de las plantas.

El contenido de auxinas, estimula la formación de raíces en las plantas tratadas. La mayor cantidad de raíces aumenta la absorción de nutrientes y el desarrollo foliar.

## SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

**MAXBIO® KELP**, es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse dentro de las doce (12) horas posteriores a su preparación.

### Recomendaciones de uso

| Cultivo | Dosis |          | Momento de aplicación                                                                                                                                                    |
|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | L/ha  | L/200 L* |                                                                                                                                                                          |
| Cebolla | 1,0   | 1,0      | 1 <sup>era</sup> . aplicación a los 15 días después de trasplante, en pleno crecimiento.<br>2 <sup>da</sup> . aplicación a los 15 días después de la primera aplicación. |

\*Volumen de aplicación promedio 200 Litros/ha.

## COMPATIBILIDAD

**MAXBIO®KELP** puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de **MAXBIO®KELP** y del otro plaguicida o sustancia afín. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos.

La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

## FITOTOXICIDAD

El producto no es tóxico a la dosis recomendada.

**Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinas**



**LIGERAMENTE TÓXICO**  
**- PRECAUCIÓN -**

**Destruya éste envase inmediatamente después de usar el producto**

