

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 250 mL

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 48 horas. PRIMEROS AUXILIOS Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica. Teléfonos de emergencia: Central de urgencias y emergencias de ESSALUD: 117 CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita). FARMEX : (01) 6306400 NOTA AL MEDICO DL₅₀: Oral aguda: > 2000 mg/Kg/Dermal Aguda: > 2000 mg/Kg NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE	MAXBIO® KELP (Citoquininas+Auxinas) CONCENTRADO SOLUBLE - SL Composición Química: Ingrediente activo: Citoquininas (como kinetina).....0.132 g/L Auxinas.....0.050 g/L Aditivos.....c.s.p.....1L REGULADOR BIOLÓGICO DE CRECIMIENTO DE USO AGRÍCOLA Reg. PBUA N° xxx – SENASA Titular del Registro: FARMEX S.A. CONTENIDO NETO 250 mL  Formulado y distribuido por: FARMEX S.A. Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima-Perú. Teléfono: 630-6400. N° de Lote: Fecha de Fab.: Fecha de Venc.:	INDICACIONES DE USO: MAXBIO® KELP, es un producto con alto contenido de citoquinina y auxina. Es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO Recomendaciones de uso <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cultivo</th> <th colspan="2">Dosis</th> <th rowspan="2">Momento de aplicación</th> </tr> <tr> <th>L/ha</th> <th>L/200 L*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cebolla</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1ª aplicación a los 15 días después del trasplante, en pleno crecimiento. 2ª aplicación a los 15 días después de la primera aplicación.</td> </tr> </tbody> </table> *Volumen de aplicación promedio 200 L/ha. NOTA AL COMPRADOR "El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas".	Cultivo	Dosis		Momento de aplicación	L/ha	L/200 L*	Cebolla	1,0	1,0	1ª aplicación a los 15 días después del trasplante, en pleno crecimiento. 2ª aplicación a los 15 días después de la primera aplicación.
Cultivo	Dosis			Momento de aplicación								
	L/ha	L/200 L*										
Cebolla	1,0	1,0	1ª aplicación a los 15 días después del trasplante, en pleno crecimiento. 2ª aplicación a los 15 días después de la primera aplicación.									



LIGERAMENTE TÓXICO
- PRECAUCIÓN -

