LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
-Este producto es tóxico si se ingiere.
-Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas de aplicación.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Neonicotinoide
-En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
-En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
-Si es ingerido: No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
-Enjuague la boca con abundante agua. NO INDUCIR AL VÓMITO.
-Si es inhalado: si respiró mueva la persona al aire fresco
-Recomendaciones generales: Consultar al médico, mostrar etiqueta.
-Antídoto: no existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13-040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)
ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847
SHARDA PERU SAC: 222-2695

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.
-Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en presencia de polinizadores.
-No aplicar si se verifica presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SHARMIDA 70 WS es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica. Es usado para controlar *thrips tabaci* en maíz.

PREPARACIÓN E LA MEZCLA:
Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con una cantidad parcial de agua, agitar bien, luego llevar esta solución al cilindro o mochila según sea el caso, añadir más agua hasta completar el volumen requerido. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar como máximo 1 aplicación por campaña.
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
SHARMIDA 70 WS es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a las dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS Y USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/kg de semilla)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre cientifico			
Maíz	Trips	*Thrips tabaci*	1.5	1	0.1

P.C. = Periodo de carencia **LMR = Límite máximo de residuos**

SHARMIDA 70 WS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO DISPERSABLE - WS

Composición:

Imidacloprid ..... 700 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 1011 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
ANHUI RESEARCHING INSTITUTE OF CHEMICAL AND INDUSTRY PILOT PLANT
363 Fuyang Road (North) 230041,
Heifei, China
Telf: 0086-551-5852528
Fax: 0086-5546067

Importado y distribuido por:
herrera & mendoza s.a.
El Palmar 153 - Lima - 12
Telf.: 479 0418
info@hm.pe

Contenido Neto: 500 g

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO