

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.



YUNKE

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 157 g/L
Imidacloprid 100 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° XXXX – SENASA

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú

Formulado y Envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China, Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru
Telf.: 717-9040 / 717-9041

Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto:

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUNKE es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotypes vorax* en el cultivo de papa.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	cc/200 L		
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes vorax</i>	250	21	0.01* 0.5**

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

P.C: Período de Carencia en días

* Fipronil

** imidacloprid



Presentaciones

500 cc

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.



YUNKE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 157 g/L
Imidacloprid 100 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° XXXX – SENASA

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú

Formulado y Envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China, Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru
Telf.: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto:
Lote N°:

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUNKE es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotypes vorax* en el cultivo de papa.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	cc/200 L		
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes vorax</i>	250	21	0.01* 0.5**

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

P.C: Período de Carencia en días

* Fipronil

** imidacloprid

