"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
-Evitar contacto con los ojos, piel y ropa
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durarte el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Neonicotinoide + Phenylpyrazoles.
-En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
-En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
-Si es ingerido: No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. NO INDUCIR AL VÓMITO.
-Si es inhalado: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
-Recomendaciones generales: Consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.
-Antídoto: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias: 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

"Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
"No aplicar en época de floración del cultivo".
"No aplicar en presencia de polinizadores".
"No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
"Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes" "Evitar la deriva por el viento".
"Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
"Peligroso para organismos acuáticos".
"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

v20140527

YUNKE

INSECTICIDA AGRICOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil	157 g/L
Imidacloprid	100 g/L
Aditivos	c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº XXX – SENASA
Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre Nº270, Ate. Lima, Perú

Formulado y Envasado por:

anasac EAST

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru
Telf.: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto:

Lote Nº:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUNKE es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotrypes vorax* en el cultivo de papa.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	cc/200 L		
Papa	Gorgojo de los andes	*Premnotrypes vorax*	250	21	0.01* 0.5**

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm P.C: Período de Carencia en días
* Fipronil
** imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar 1 aplicación por campaña año, cuando se observen los primeros adultos de la plaga en el cultivo. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su manejo de la resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO: 48 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con la mayoría de los productos insecticidas y fungicidas comúnmente usados. Siempre realice una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta no es fitotóxico a las dosis y cultivo recomendado.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Presentaciones

20 - 200 L

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
-Evitar contacto con los ojos, piel y ropa
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Neonicotinoide + Phenylpyrazoles.
-En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
-En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
-Si es ingerido: No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. NO INDUCIR AL VÓMITO.
-Si es inhalado: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
-Recomendaciones generales: Consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.
-Antídoto: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-13-040 - Centro Nacional de Emergencias: 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.

ECOLOGÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

"Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
"No aplicar en época de floración del cultivo".
"No aplicar en presencia de polinizadores".
"No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
"Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes" "Evitar la deriva por el viento".
"Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
"Peligroso para organismos acuáticos".
"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros". "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

v20140527

YUNKE

INSECTICIDA AGRICOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil	157 g/L
Imidacloprid	100 g/L
Aditivos	c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº XXX – SENASA
Titular del registro: Hortus S.A.
Calle Sucre Nº270, Ate. Lima, Perú

Formulado y Envasado por:

anasac EAST

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Peru
Telf.: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto:

Lote Nº:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUNKE es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Es usado para el control de *Premnotrypes vorax* en el cultivo de papa.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **YUNKE**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	cc/200 L		
Papa	Gorgojo de los andes	*Premnotrypes vorax*	250	21	0.01* 0.5**

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm P.C: Período de Carencia en días
* Fipronil
** imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar 1 aplicación por campaña año, cuando se observen los primeros adultos de la plaga en el cultivo. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su manejo de la resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO: 48 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con la mayoría de los productos insecticidas y fungicidas comúnmente usados. Siempre realice una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta no es fitotóxico a las dosis y cultivo recomendado.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.