



FUNGICIDA DE USO AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cymoxanil.....80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... csp 1Kg

REG. PQUA N° 400 - SENASA



TITULAR DEL REGISTRO:
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
Changfenghe Road, Nanjing,
Chemical Industrial Park, Luhe
district, Nanjing 210 047 - CHINA

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA *Fausto***Piaggio**
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú
Telf.:464-2222 Fax:464-2211
e-mail:ventas@piaggio.com.pe
RUC:20100244471

Contenido Neto: 5 Kilos

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico:
Cymoxanil: Cianoacetamidas-oximes
Mancozeb: Dithiocarbamato
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con agua abundante y jabón. En caso de ingestión no provocar el vómito; avisar a un médico. En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.
Nota al médico: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático. En caso de emergencia llamar a los teléfonos:
CICOTOX: 0800-13040 / 328-7398
INFOSALUD: 0800-10828

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
No permitir el ingreso de animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlos en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
TANKING es un fungicida curativo – preventivo a base de cymoxanil y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: cianoacetamidas-oximes y dithiocarbamatos, respectivamente.
TANKING tiene acción sistémica y de contacto.

Agregue **TANKING** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente **TANKING** en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
Soc. An. Fausto Piaggio garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE DOSIS Y USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil 200L		
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	-	0.45 - 0.5	7	0.5* 1**
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.5 - 0.75	8	0.05
Pimiento	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	-	0.4	7	0.05* 5**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2 - 2.5	-	28	0.2* 5**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.
Cymoxanil*
Mancozeb**

