

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazol

- Si el producto ha sido ingerido accidentalmente y la persona está consciente, provocar el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. En caso de inhalación proporcionar aire fresco y trasladar al paciente para atención médica. No se debe dar aceite de ricino, leche, ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

PREDATOR[®] 200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:..... 200 g/L
Fipronil.....
Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 511-SENASA

Titular de Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.



Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangbei ST, Ningbo 315000
China

Contenido Neto: 250 mL
Lote N°:
Fecha Fab.:
Fecha Venc.:

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 257,
La Victoria, Lima-Perú
Telf. 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREDATOR 200 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión afectando principalmente al sistema nervioso central de los insectos. Tiene mayor afinidad por los receptores de los insectos complejos, lo cual mejora la selectividad.
Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/ cil 200 L		
Capsicum annum	Mosquilla o caracha	Prodiptosis longifolia	0.5	0.25	21	0.005
Espárrago	Mosquilla o caracha	Prodiptosis longifolia	----	0.25	21	0.005

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
Intervalo entre aplicaciones: 14 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazol

- Si el producto ha sido ingerido accidentalmente y la persona está consciente, provocar el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de inhalación proporcionar aire fresco y trasladar al paciente para atención médica. No se debe dar aceite de ricino, leche, ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040

Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

PREDATOR[®] 200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición: 200 g/L
Fipronil.....
Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 511-SENASA

Titular de Registro:



**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.**



Formulado por:
SINOCHEN AGRO CO., LTD.
17-188 P. N° 33 He Nan Road(s)
Shanghai, China

Contenido Neto: 250 mL
Lote N°:
Fecha Fab.:
Fecha Venc.:

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 257,
La Victoria, Lima-Perú
Tel: 710-4000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREDATOR 200 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión afectando principalmente al sistema nervioso central de los insectos. Tiene mayor afinidad por los receptores de los insectos complejos, lo cual mejora la selectividad.
Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/ cil 200 L		
Capsicum annum	Mosquilla o caracha	Prodiptosis longifolia	0.5	0.25	21	0.005
Espárrago	Mosquilla o caracha	Prodiptosis longifolia	----	0.25	21	0.005

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
Intervalo entre aplicaciones: 14 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

