"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación a los ojos, evite el contacto.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazol

- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No administre nada a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los parpados bien abiertos y lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar a un médico si persisten las molestias oculares.
- En caso de contacto con la piel ó ropa, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, proporcionar aire fresco y trasladar al paciente para atención médica. No se debe dar aceite de ricino, leche, ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.

Nota al Médico: No se conoce antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SERFI: (01) 710-4068

PREDATOR® 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 511-SENASA

Titular del Registro:

Serfi

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO. LTD
17 Jinli E. N°93 He Nan Road,
Shanghai, China

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4068

Contenido Neto: 0.25 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREDATOR®200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los fenilpirazoles. Actúa por contacto e ingestión afectando principalmente al sistema nervioso central de los insectos. Tiene mayor afinidad por los receptores de los insectos complejos, lo cual mejora la selectividad.

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/ cil 200 L		
Café	Broca del café	*Hypothenemus hampei*	----	0.20	7	0.005
Capsicum annuum	Mosquilla o caracha	*Prodiplosis longifila*	0.5	0.25	21	0.005
Espárrago	Mosquilla o caracha	*Prodiplosis longifila*	----	0.25	21	0.005

PC: Período de Carencia. / **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

ESPEJO'S GRAF S.A.C.
GRÁFICA INTEGRAL

Etiqueta: **PREDATOR x 0.25 L** (Sinochem Agro)

Fecha: 30-11-2021

Producto Cian
Producto Amarillo
Producto Magenta
Producto Negro

Medida : 7 x 21 cm
Material: Couche brillante de 115 grs.
Frasco: COEX

CMYK

Serfi