

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación a los ojos, evite el contacto.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazol

- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta. No administre nada a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los párpados bien abiertos y lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar a un médico si persisten las molestias oculares.
- En caso de contacto con la piel ó ropa, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, proporcionar aire fresco y trasladar al paciente para atención médica. No se debe dar aceite de ricino, leche, ni aceites comestibles porque aceleran la absorción del producto.

Nota al Médico: No se conoce antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia
EsSalud: 411-8000 (opción 4)

PREDATOR[®] 200 SC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Pipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 511-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
SINOCHEN AGRO CO. LTD.
17-18th fl, N°33 He Nan Road,
Shanghai, China

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Contenido Neto: 0.25 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREDATOR[®] 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los fenilpirazoles. Actúa por contacto e ingestión afectando principalmente al sistema nervioso central de los insectos. Tiene mayor afinidad por los receptores de los insectos complejos, lo cual mejora la selectividad.

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/ct 200 L		
Café	Broca del café	<i>Hypothenemus hampei</i>	----	0.20	7	0.005
<i>Capsicum annum</i>	Mosquilla o caracha	<i>Prodictiplosis longifila</i>	0.5	0.25	21	0.005
Espárrago	Mosquilla o caracha	<i>Prodictiplosis longifila</i>	----	0.25	21	0.005

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

