

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial: WARRANT POWER® 460 ZC

Nombre químico:

Gamma Cyhalothrin: (S)-a-Cyano-3-phenoxybenzyl (z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.
Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridinyl)methyl-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

Nombre común: GAMMA CYHALOTHRIN, IMIDACLOPRID

Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Registro PQUA N° 1015 - SENASA

Composición:

Gamma Cyhalothrin.....30 g/L
Imidacloprid.....430 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L


Fórmula empírica: Gamma Cyhalothrin: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃
Imidacloprid: C₉H₁₀Cl₂N₃O₂

Peso molecular: Gamma Cyhalothrin: 449.86 g/mol.
Imidacloprid: 255.7 g/mol.

Fórmula estructural:

Gamma Cyhalothrin

Imidacloprid



PRESENTACIONES COMERCIALES:
250ml, 500ml, 1L, 5L y 20L.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Líquido.
- Color: Beige opaco.
- Olor: Característico.

Almacenamiento: WARRANT POWER® 460 ZC conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental y en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Asegurar un buen almacenamiento con humedad y temperaturas controladas, alturas de arrumes y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- Lavar los equipos de aplicación después de su uso.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Evitar los riesgos de su inflamabilidad, corrosividad, higroscopicidad, toxicidad y explosividad.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:**
NEONICOTINOIDE: Imidacloprid.
PIRETROIDE: Gamma Cyhalothrin.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01-421-4811
CISPROQUIM®: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.”
“Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado” y “Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.”



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

	Produto: Hoja Informativa - Warrant Power	CORES:
	País: Brasil - Origem: Perú	■ PRETO
	Revisão: Rev05 - 25/11/21	■ PANTONE YELLOW C
	SKU label atual: n/a	■ PANTONE 343 C
	SKU label novo:	■ PANTONE 287 C
Alterações:	JOB: 337/21	Logos Farmagro e FMC em CMYK
	Formato RT: 312 mm x 130 mm	
	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)	

PICTOGRAMAS: 7 x 7 mm

Tamaño de letra: 8 pt.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
WARRANT POWER® 460 ZC es sistémico y de contacto.
WARRANT POWER® 460 ZC es un insecticida que combina la acción sistémica de imidacloprid, con la acción de contacto y residual de gamma cyhalothrin.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
WARRANT POWER® 460 ZC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada, en un tercio del volumen a utilizar.
Agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN
WARRANT POWER® 460 ZC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.15 - 0.20	7* 21**	1* 1.5**
PAPA	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.40	7	0.1* 0.5**
	“Gorgojo de los andes”	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.20 - 0.25	3* 21**	0.02* 0.5**
TOMATE	“Polilla”	<i>Tuta (=Scrobipalpula) absoluta</i>	0.60	7	0.1* 0.5**

* Gamma cyhalothrin
** Imidacloprid
PC: Periodo de Carencia (días).
LMR: Límite Máximo Residuos (ppm: partes por millón).
Para el cultivo de Papa se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
Para el cultivo de Arroz se recomienda realizar hasta dos aplicaciones por campaña.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Número máximo de aplicaciones sucesivas, o por cosecha, o por campaña, o por año: Realizar hasta dos aplicaciones por campaña/año cuando el nivel de daño económico lo justifique previa evaluación de campo.

PERÍODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
WARRANT POWER® 460 ZC La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.”

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:
No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES:
No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Warrant Power® 460 ZC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN FIJA DE CÁPSULAS (ZC)

Titular de Registro:
FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas
Nº 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización
Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ.

Formulado por:
CHEMINOVA A/S
P.O. Box 9 - DK 7620
Lemvig - Dinamarca

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio.
Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517
FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

