

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Usar anteojos protectores, durante el manejo y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Evite inhalar la niebla porque este producto irrita la piel y las mucosas.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Por tratarse de un producto corrosivo, se recomienda lavar muy bien los equipos inmediatamente después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar en ambiente protegido de la luz solar, ventilado y seco.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Derivado de ácido fosfónico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa (lavarla antes de volverla a usar) y lavarse las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón. Si presenta irritación a la piel acudir al médico. En caso de ingestión, provocar el vómito con agua tibia y guardar reposo, acudir al médico. En caso de inhalación, deje de aplicar el producto, retírese del área de aplicación y obtenga atención médica. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia y obtener atención médica. PREP 720 es un producto de baja toxicidad y no tiene ni requiere un antídoto específico.
- Antídoto:** No existe un antídoto específico.

**-Indicaciones para el médico:**

Tratamiento sintomático. En caso de ingestión, si se requiere un lavado gástrico se debe realizar con mucho cuidado debido a la posibilidad de perforación del estómago o del esófago.


**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**  
**CICOTOX:0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos o envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

Composición:  
 Ethephon, 721.3 g/l  
 Aditivos, csp 1 L

Reg. RCP N° 007-SENASA  
 Titular del Registro:  
 Bayer S.A.  
 Paseo de la República 3074  
 Piso 10 San Isidro

FORMULADO POR:  
 Bayer CropScience  
 P.O. Box 12014 2 TW Alexander  
 Drive Research Triangle Park  
 North Carolina 27709  
 U.S.A.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
 Bayer S.A.  
 Paseo de la República 3074  
 San Isidro, Lima - Perú  
 Telf. 2113800



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**Contenido  
 Neto: 1 litro**

Lote N°  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

-Se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua. Realizar una pre- mezcla en un volumen reducido de agua y luego completar al volumen indicado. Para el caso del tratamiento por inmersión diluir la cantidad indicada de Prep 720 en 100 L de agua y tratar los frutos por 2 minutos.

-Se aplica en aspersiones foliares con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor. En la calibración se ajusta el equipo de aplicación con la velocidad del operario, con el fin de lograr que el producto se distribuya en forma homogénea en el área.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	USO	DOSIS L/ha	INSTRUCCIONES	L.M.R.* (ppm)	P.C.** (días)
Algodón	Apertura de bellotas y defoliación.	2.0	Aplicar con mínimo 90% de bellotas fisiológicamente maduras.	2.0	7-14
Caña de Azúcar	Estimulación de brotamiento de yemas en estacas (semillas).	0.5 - 0.7	Aplicar sobre las estacas (semillas) y taparlas de inmediato con suelo.	0.1	70
	Inducción al brotamiento de plantas socas.	0.5 - 0.7	Aplicar sobre plantas socas de 40 a 50 cm de altura.		70
	Maduración	1.0	Aplicación foliar a 50 cm de la punta de la planta en el último riego de "agoste".		70
Arroz	Incremento de rendimiento.	0.5	Aplicar al inicio del macollamiento.	0.2	30
Piña	Inducción de la floración.	1.0 - 1.5	Aplicar en mezcla con una solución de 4 kg de urea por 100 litros de agua.	2.0	14
Cebolla	Secado de hojas y cierre del cuello (cosecha)	0.5 - 1.0	Aplicar 15 días antes del "arranque" o cosecha	0.5	N.d
Tomate	Maduración y coloración de los frutos.	1.0 - 1.5	Aplicar después de la primera cosecha sobre frutos fisiológicamente maduros.	2.0	3
Mango	Maduración y coloración de los frutos cosechados.	0.25 - 0.3 l/100 l agua	Inmersión de frutos por 2 minutos.	0.05	N.a
Manzano	Maduración y coloración de frutos.	0.2	Aplicar 2 a 3 semanas antes de la cosecha dirigiendo la aspersión a los	5.0	14
Plátano	Maduración y coloración de frutos cosechados.	0.25 - 0.3 l/100 l agua	Inmersión de los frutos por 2 minutos.	0.05	N.a
Café	Maduración de frutos cosechados.	0.1 l/100 l de agua	Inmersión de frutos por 2 minutos.	0.1	N.a
Uva	Maduración y coloración de los racimos.	0.3 - 0.5	Aplicar dirigido a los racimos al "envero" (cambio de color).	0.7	N.d
	Defoliación y maduración de las yemas.	1.5	Para maduración de yemas aplicar con buena cobertura un mes antes de la poda		

\* LMR = Límite máximo de residuos. \*\* PC = Período de carencia. N.a. = No aplica N.d. = No determinado  
 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se indica en el cuadro de usos.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

PREP 720 es muy inestable en presencia de compuestos alcalinos. Usar aguas neutras, no duras para la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

\*El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

