

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Usar anteojos protectores, durante el manejo y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Evite inhalar la niebla porque este producto irrita la piel y las mucosas.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Por tratarse de un producto corrosivo, se recomienda lavar muy bien los equipos inmediatamente después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber o fumar durante las operaciones de aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar en ambiente protegido de la luz solar, ventilado y seco.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Derivado de ácido fosfónico.
- En caso de contacto con la piel, quítarse la ropa (lavarla antes de volverla a usar) y lavarse las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón. Si presenta irritación a la piel acudir al médico. En caso de ingestión, provocar el vómito con agua tibia y guardar reposo, acudir al médico. En caso de inhalación, deje de aplicar el producto, retírese del área de aplicación y obtenga atención médica. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia y obtener atención médica. PREP 720 es un producto de baja toxicidad y no tiene ni requiere un antidoto específico.
- Antidoto: No existe un antidoto específico.
- Indicaciones para el médico:
Tratamiento sintomático. En caso de ingestión, si se requiere un lavado gástrico se debe realizar con mucho cuidado debido a la posibilidad de perforación del estómago o del esófago.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106Bayer S.A. 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos o envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar y mantener las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna, flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Formulado por:

Bayer S.A.
Carrera 50 Calle
Barranquilla
Sociedad - Alentio
Columbus

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Reg. ROP N° 007-SENAS

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Composición:

Ethephon, 721.3 g/l
Aditivos, csp 1 L

Concentrado Soluble (SL)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-Se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua. Realizar una pre-mezcla en un volumen reducido de agua y luego completar al volumen indicado. Para el caso del tratamiento por inmersión diluir la cantidad indicada de Prep 720 en 100 L de agua y tratar los frutos por 2 minutos.

Modo de empleo: Se aplica en aspersiones foliares con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tracción mecánica. Aplicación con la velocidad del operario, con el fin de lograr que el producto se distribuya en forma homogénea en el área.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	USO	Dosis L/ha	INSTRUCCIONES	P.C.** (días)	L.M.R.* (ppm)
Algodón	Apertura de bellotas y selección.	2.0	Aplicar con mínimo 90% de bellotas fisiológicamente maduras.	7-14	2.0
Caña de Azúcar	Estimulación y crecimiento de yemas en estacadas.	0.5 - 0.7	Aplicar sobre las estacas (derramas) y yemas de yemas.	70	
	Inducción al arbolamiento de plantas.	0.5 - 0.7	Aplicar sobre plantas socas.	70	0.1
	Maduración	1.0	Aplicación foliar a 50 cm de altura en el último riego de agosto.	70	
Yrroz	Incremento de rendimiento.	0.5	Aplicar al inicio del masallamiento.	30	0.2
Piña	Inducción de la floración.	1.0 - 1.5	Aplicar en mezcla con una solución de urea por 100 litros de agua.	14	2.0
Cebolla	Secado de hojas y cierre del cuello (cosecha).	0.5 - 1.0	Aplicar 15 días antes del arranque o cosecha.	N.a	0.5
Tomate	Maduración y coloración de los frutos.	1.0 - 1.5	Aplicar después de la primera cosecha, a los frutos fisiológicamente maduros.	3	2.0
Mango	Maduración y coloración de los frutos cosechados.	0.25 - 0.3	Inmersión de frutos por 2 minutos.	N.a	0.05
Mancero	Maduración y coloración de frutos.	0.2	Aplicar 2 a 3 semanas antes de la cosecha dirigiendo la aspersión a los frutos.	14	5.0
Pilano	Maduración y coloración de frutos cosechados.	0.25 - 0.3	Inmersión de los frutos por 2 minutos.	N.a	0.05
Café	Maduración de frutos cosechados.	0.1 U/100 de agua	Inmersión de frutos por 2 minutos.	N.a	0.1
Uva	Maduración y coloración de los racimos.	0.3 - 0.5	Aplicar dirigido a los racimos al "envero" (cambio de color).	N.a	0.7
	Defoliación y maduración de las yemas.	1.5	Para maduración de yemas aplicar con buena cobertura.	N.a	

*L.M.R. = Límite máximo de residuos. **P.C. = Período de carencia.
COMPATIBILIDAD: PREP 720 es muy estable en presencia de compuestos alcalinos. Usar aguas neutras, no duras para la mezcla.
FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las instrucciones de uso. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, pueden ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones y precauciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto."

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

