

0.40 centímetros

0.40 centímetros

20.00 centímetros

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Spiroketalamine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, no le de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar suavemente y lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto luego de 5 minutos y continuar enjuagando los ojos.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Teléfonos de emergencia: **CISPROQUIM: 080-050-847**
FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

NOTA AL MÉDICO

- No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.



Sancrop®


PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Spiroxamine..... 500 g/L
Aditivos..... c.s.p... 1.0 L


Reg. PQUA N° 1017 - SENASA

Propiedades del ingrediente activo (spiroxamine):
Grupo químico: Spiroketalamine.
Nombre IUPAC: 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine
Formula empírica: C₁₈H₃₀NO₂
Densidad: 0.93 g/mL (20°C)
Peso molecular: 297.5 g/mol.
Solubilidad en agua: 470 mg/L a 20 °C (isómero A), 340 mg/L a 20 °C (isómero B).

Formula estructural:
Isómero A:



Isómero B:



Propiedades del producto formulado (SANCROP)
Aspecto: Líquido de color amarillo claro a marrón cristalino aromático.
Estabilidad en almacenamiento: 2 años.
Densidad: 0.9 - 1.0 g/mL
pH: 5.0 - 11.0
Capacidad y clase de los envases: Presentaciones de 250 mL, 500 mL y 1 L en frascos COEX, 20 L en galonera COEX y 200 L en cilindro metálico.

Titular del Registro: FARMEX S.A.
Formulado por:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Changfeng Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe, Nanjing, China 210047

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (511) 630-6400
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMEX S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.40 centímetros

20.00 centímetros

0.40 centímetros

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable y lejos de fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes de goma, botas de jébe, careta o gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SANCROP®** es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicativa que penetra rápidamente dentro del tejido de la hoja, seguido de una translocación acropétala hasta la punta de la hoja.
- **SANCROP®** es un fungicida Inhibidor de la Biosíntesis del Esterol (SBI), actúa inhibiendo la biosíntesis de los esteroides fúngicos.
- **SANCROP®** se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	%	L/ha		
ALCACHOFA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5 -0.6	N.D	0.7
PIMIENTO, PÁPRIKA, PIQUILLO	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5 -0.6	N.D	0.05
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	-	14	1

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

P.C.: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña como máximo, siendo una campaña por año para vid, pimiento y alcachofa, y con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de las enfermedades que controla, o cuando la planta empiece a presentar los primeros síntomas.

PERÍODO DE REINGRESO

No permitir reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación a niños, personal en general y animales.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes fuertemente oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

SANCROP® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

0.40 centímetros

0.40 centímetros

15.60 centímetros

015.60 centímetros