

0.40 centímetros

0.40 centímetros

0.40 centímetros

0.40 centímetros

20.00 centímetros

15.60 centímetros

015.60 centímetros

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Spiroketalamine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, no le de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar suavemente y lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto luego de 5 minutos y continuar enjuagando los ojos.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Teléfonos de emergencia: **CISPROQUIM: 080-050-847**  
**FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

NOTA AL MÉDICO

- No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.

Sancrop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:  
Spiroxamine..... 500 g/L  
Aditivos..... c.s.p... 1.0 L


Reg. PQUA Nº 1017 - SENASA

**Propiedades del ingrediente activo (spiroxamine):**  
**Grupo químico:** Spiroketalamine.  
**Nombre IUPAC:** 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine  
**Formula empírica:** C<sub>18</sub>H<sub>30</sub>NO<sub>2</sub>  
**Densidad:** 0.93 g/mL (20°C)  
**Peso molecular:** 297.5 g/mol.  
**Solubilidad en agua:** 470 mg/L a 20 °C (isómero A), 340 mg/L a 20 °C (isómero B).

**Formula estructural:**  
**Isómero A:**



**Isómero B:**



**Propiedades del producto formulado (SANCROP)**  
**Aspecto:** Líquido de color amarillo claro a marrón cristalino aromático.  
**Estabilidad en almacenamiento:** 2 años.  
**Densidad:** 0.9 - 1.0 g/mL  
**pH:** 5.0 - 11.0  
**Capacidad y clase de los envases:** Presentaciones de 250 mL, 500 mL y 1 L en frascos COEX, 20 L en galonera COEX y 200 L en cilindro metálico.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

**Formulado por:**  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8,  
Lengjing Street, Street, Ningbo 315010,  
Zhejiang, P. R. China.

**Importado y distribuido por:**



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (511) 630-6400  
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMEX S.A.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

0.40 centímetros

20.00 centímetros

0.40 centímetros

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable y lejos de fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes de goma, botas de jébe, careta o gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SANCROP®** es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicativa que penetra rápidamente dentro del tejido de la hoja, seguido de una translocación acropétala hasta la punta de la hoja.
- **SANCROP®** es un fungicida Inhibidor de la Biosíntesis del Esterol (SBI), actúa inhibiendo la biosíntesis de los esteroides fúngicos.
- **SANCROP®** se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO                        | ENFERMEDADES |                           | DOSIS |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------|
|                                | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO         | %     | L/ha      |                |                 |
| ALCACHOFA                      | Oidiosis     | <i>Leveillula taurica</i> | -     | 0.5 - 0.6 | N.D            | 0.7             |
| PIMIENTO,<br>PÁPRIKA, PIQUILLO | Oidiosis     | <i>Leveillula taurica</i> | -     | 0.5 - 0.6 | N.D            | 0.05            |
| VID                            | Oidiosis     | <i>Erysiphe necator</i>   | 0.06  | -         | 14             | 1               |

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos.

**P.C.:** Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña como máximo, siendo una campaña por año para vid, pimiento y alcachofa, y con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de las enfermedades que controla, o cuando la planta empiece a presentar los primeros síntomas.

PERÍODO DE REINGRESO

No permitir reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación a niños, personal en general y animales.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes fuertemente oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

**SANCROP®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

