

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: MORPHOLINE
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, no le de nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar suavemente y lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto luego de 5 minutos y continuar enjuagando los ojos.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:**  
**Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud: 117 (gratuito), CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó (01)328-7398, CISPROQUIM: 0800-5-0847; Farmex S.A.: (01) 630-6400.**

#### NOTA AL MÉDICO

- No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.

# SANCROP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### COMPOSICION QUIMICA

Spiroxamine.....500 g/l  
Aditivos.....c.s.p 1.0 l

Reg. N°

Grupo químico: Morpholine

Formula empírica:  $C_{18}H_{35}NO_2$

Peso molecular: 297.5 g/mol.

Soluble en agua: 470 mg/L a 20 °C (isómero A),  
340 mg/L a 20 °C (isómero B).

Titular del Registro:

**FARMEX S.A.**

Fabricado por:

**Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.**

Changfenghe Road, Nanjing Chemical

Industrial Park, Luhe, Nanjing, China 210047



Formulado, importado y distribuido por:

**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, Lima-27, Perú.

Teléfono: 6306400, Fax: 630-6410.

NO  
CORROSIVO

NO  
INFLAMABLE

NO  
EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- El almacén debe ser exclusivo de tóxicos químicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable y lejos de fuentes de calor.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación o el reingreso a áreas tratadas (overol, guantes de goma, botas de jebe, careta o gafas).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- SANCROP es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicativa que penetra rápidamente dentro del tejido de la hoja, seguido de una translocación acropétala hasta la punta de la hoja.
- SANCROP es un fungicida Inhibidor de la Biosíntesis del Esterol (SBI), actúa inhibiendo la biosíntesis de los esteroides fúngicos.
- SANCROP se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedades		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	l/ha		
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	0.06	-	14	1.00
Pimiento, pprika, piquillo	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5-0.6	N.d	0.01
Alcachofa	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5-0.6	N.d	0.05

PC: Perodo de carencia en das. LMR: Lmite mximo de residuos en partes por milln.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar SANCROP (i.a Spiroxamine) dos aplicaciones por campaa como mximo, siendo una campaa por ao para vid, pimiento y alcachofa, y con un intervalo mnimo entre aplicaciones de 15 das. Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de las enfermedades que controla, o cuando la planta empiece a presentar los primeros sntomas.

### PERODO DE REINGRESO

No permitir reingresar sin proteccin a un campo aplicado hasta 24 horas despus de la aplicacin a nios, personal en general y animales.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayora de plaguicidas, excepto con agentes fuertemente oxidantes y cidos fuertes.

### FITOTOXICIDAD

SANCROP no ha mostrado sntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

