

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847. CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 117 (Gratuito).



Contenido neto:

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

SUPPORT

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 100 g/L
Imidacloprid 350 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° XXXX – SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado y Envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China, Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú

Tel.: 717-9040 / 717-9041

Fax: 718-8684

RUC: 20101637221

RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPPORT proporciona una protección amplia contra las plagas. Fipronil del grupo de los Fenylpyrazoles tiene una acción antagonista del canal de sodio e Imidacloprid del grupo de los Neonicotinoides es antagonista de los receptores nicotínicos. Ambos componentes lo convierten en un producto muy eficiente para el manejo de resistencia de plagas, brindando un poder residual y una estrategia anti resistencia en el combate de plagas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **SUPPORT**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener en agitación constante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha*	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0,5 – 0,6	21	0.005 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días, intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

LMR: Límites máximos de residuos en ppm

⁽¹⁾ Fipronil ⁽²⁾ Imidacloprid

* Volumen de agua: para lograr una buena cobertura use al menos 500 L agua/ha.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Presentaciones

300-500cc

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847. CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 117 (Gratuito).



Contenido neto:

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

v20140504

SUPPORT

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 100 g/L

Imidacloprid 350 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° XXXX – SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado y Envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China, Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041

Fax: 718-8684

RUC: 20101637221

RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPPORT proporciona una protección amplia contra las plagas. Fipronil del grupo de los Fenilpyrazoles tiene una acción antagonista del canal de sodio e Imidacloprid del grupo de los Neonicotinoides es antagonista de los receptores nicotínicos. Ambos componentes lo convierten en un producto muy eficiente para el manejo de resistencia de plagas, brindando un poder residual y una estrategia anti resistencia en el combate de plagas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **SUPPORT**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener en agitación constante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha*	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0,5 – 0,6	21	0.005 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días, intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

LMR: Límites máximos de residuos en ppm

⁽¹⁾ Fipronil ⁽²⁾ Imidacloprid

* Volumen de agua: para lograr una buena cobertura use al menos 500 L agua/ha.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

