

ANTAGON

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Trichoderma harzianum, : 1 x10⁸ conidias viables

por gramo de producto,100%

Reg.PBUA N° 268 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:



DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.

Jr. Niquel N° 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Formulado por:



INNOVAK COLOMBIA SAS

Carrera 6 17ª N° 7-13 Sopo
(Cundinamarca) - Colombia

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 500 g.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.
- Usar elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para períodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado de 5° a 10° C. Las temperaturas bajas solidifican el producto y lo conservan con toda su calidad.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente está consciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón
- Teléfono de emergencia:

SAMU: 106

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL: 01 544-4394

Antídoto: No hay antídoto específico, tratar sintómicamente

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Después de usar el contenido destruir este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ANTAGON WP**, actúa por competencia y antagonismo con los microorganismos fitopatógenos. Por lo tanto la aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la enfermedad y hacia las áreas que originan la infección o son fuente de ella.

Sistemas de preparación y aplicación

- Aplicar foliamente de rotación dirigida hacia la enfermedad.
- No mezclarlo con fungicidas o sustancias de pH alcalino. Se recomienda mezclarlo con azúcar o melaza entre 1% a 2%.
- Para el cultivo de:
 - Mango aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo.
 - Pimiento aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo.
 - Arándano aplicar en la etapa de floración.
- Antes de aplicar el producto asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos 4 veces con abundante agua.
- Se recomienda mezclarlo con aceite agrícola (80cc), haciendo primero una premezcla y luego disolver en el tanque. Después agite vigorosamente la mezcla y complete el volumen de agua a emplear en la aplicación. Después de realizar la mezcla con agua se debe aplicar el producto en el menor tiempo posible. Si el volumen de la mezcla es muy grande y toma varias horas, agite la mezcla periódicamente.

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de dos veces por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Regresar al área tratada después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede ser usado en programas de agricultura orgánica, manejo integrado de cultivos MIC, rotación con otros plaguicidas. El producto no debe mezclarse con agentes oxidantes fuertes, ácidos o hidróxidos, así como fertilizantes amoniacales, azufre o cal.

FITOTOXICIDAD: ANTAGON WP no es fitotóxico, ni fitopatógeno.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"Consulte a un ingeniero agronomo"

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
	Común	Técnico	Kg/Ha	Kg/200L		
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	1.5		N.A	N.A
Cafe	Roya del cafe	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.5		N.A	N.A
Palto	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>		0.5	N.A	N.A
Quinua	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>		0.5	N.A	N.A
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>		0.5	N.A	N.A
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0		N.A	N.A
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0		N.A	N.A

N.A = No aplica. P.C. Periodo de carencia (días). L.M.R. = Limite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

