LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVENTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

Evitar e contacto con la piel, los ojos y los vestidos.

usar elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, guantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para periodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado de 5° a 10° C. Las temperaturas bajas solidifican el producto y lo conservan con toda su calidad.

El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas. Debe protegerse de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vomito, especialmente si el paciente esta inconsciente.
En caso de inhalación, al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón

.
.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico, tratar sintomáticamente

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
DESARROLLO TECNICO VEGETAL: 01 544-4394

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

Después de usar el contenido destruya este envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.

INSTRUCCIONES USO Y MANEJO: ANTAGON WP actúa por competencia y antagonismo con los microorganismos fitopatógenos. Por lo tanto la aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la enfermedad y hacia las áreas que originan la infección o son fuente de ella.

ANTAGON WP, plicar por aspersión preferiblemente dirigido hacia la enfermedad. - No mezclarlo con fungicidas o sustancias de pH alcalino. Se recomienda mezclarlo con azúcar o melaza entre 1% a 2%. Para el cultivo de pimiento aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo

Antes de aplicar el producto asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos 4 veces con abundante agua.

Sistemas de preparación y aplicación
-Aplicar foliarmente de preferencia dirigido hacia la enfermedad.
- No mezclarlo con fungicidas o sustancias de pH alcalino. Se recomienda mezclarlo con azúcar o melaza entre 1% a 2%.
- Para el cultivo de:
  Mango aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo.
  Pimiento aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo.
  Arándano aplicar en la etapa de floración.
- Antes de aplicar el producto asegúrese que no se encuentren residuos de otros productos en los tanques de mezcla, ni en las mangueras de aplicación, para lo cual se recomienda lavarlos por lo menos 4 veces con abundante agua.
-Se recomienda mezclarlo con aceite agrícola (80cc), haciendo primero una premezcla y luego disolver en el tanque. Después agite vigorosamente la mezcla y complete el volumen de agua a emplear en la aplicación. Después de realizar la mezcla con agua se debe aplicar el producto en el menor tiempo posible. Si el volumen de la mezcla es muy grande y toma varias horas, agite la mezcla periódicamente.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Común	Tecnico	Kg/Ha	Kg/200L		
Mango	Oidium	*Oidium mangiferae*	0.5		N.A.	N.A.
Cafe	Roya del cafe	*Hemileia vastatrix*	0.5		N.A.	N.A.
Palto	Botritis	*Botrytis cinerea*		0.5	N.A.	N.A.
Quinua	Mildiu	*Peronospora farinosa*		0.5	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	*Erysiphe necator*		0.5	N.A.	N.A.
Arandano	Moho gris	*Botrytis cinerea*	1.0		N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*	1.0		N.A.	N.A.

N.A. = No aplica. P.C. Periodo de carencia (días).
L.M.R. = Limite máxima de residuo en partes por millón (ppm) .

PERIODO DE REINGRESO
Regresar al área tratada después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD: Puede ser usado en programas de agricultura orgánica, manejo integrado de cultivos MIC, rotación con otros plaguicidas. El producto no debe mezclarse con agentes oxidantes fuertes, ácidos o hidróxidos, así como fertilizantes amoniacales, azufre o cal.

FITOTOXICIDAD: ANTAGON WP no es fitotóxico, ni fitopatógeno.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones

ANTAGON

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:
Trichoderma harzianum:
1×10^8 conidias viables por gramo de producto.....100%

Reg.PBUA N° 268 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Formulado por:

INNOVAK COLOMBIA SAS
Carrera 6 17ª N° 7-13 Sopo
(Cundinamarca) - Colombia

PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS
Forma: Solido en polvo
Color: Verde pálido
Olor: Característico del producto
Densidad: 300 - 500 g/L
pH: 5.5. 7.0
Persistencia de espuma: 4 mL

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES
Envases: Bolsas, Aluminio trilaminada (polietileno-metalizado y poliester.
Capacidad: 500 g y 1 kg, 5Kg, 10Kg.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCION

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA