LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

–Este producto es dañino, no ingerir
–Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
–Causa irritación moderada a los ojos
–Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
–Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
–Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
–No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
–Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
–Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo Químico: BENZIMIDAZOL.
-En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
-En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si , el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico
-En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte a un édico.
-En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua.
-En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.

Nota: No tiene antídoto, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

–Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
–Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
–Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

–Peligroso para organismos acuáticos
–No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
–Aplicar temprano o en las tardes. Evitar la derive por el viento.
–No contaminar ríos, estanques o arroyos con lo desechos o envases vacíos.
–No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
–Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 5 metros.
–Peligroso para los animales domésticos , fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
–El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
–En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
–No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
–Altamente tóxico para peces y abejas.

SPECTRUM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Carbendazim .....500 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg.N° 1031-SENASA

Formulador:
Stockton Agrimor AG
Dirección: 23/F Rihao Bldg. Bao An South Rd. Zhenzhen Zhejiang, China
China

Importado y Distribuido por:
Solandina Perú SAC.
Tel.: +51960241693
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of.902
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES
LIMA - PERÚ

Titular del Registro:
AGRO INGENIUM S.A.C.
RUC: 20601259673
Calle Los Acantos 167, Int. 104
Ate, Lima, Lima - Perú
Tel.: 992-773-871

Solandina

Contenido Neto: 1L
Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPECTRUM es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa adsorbida por las raíces y transportada hacia toda la planta , recomendada para el control de una diversidad de enfermedades en varios cultivos.

PREPARACIÓN - APLICACIÓN

Preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego la solución se mezcla en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido , agitar y aplicar.
Al aplicar el producto tener en cuenta de hacer un buen cubrimiento de la planta incluido follajes, flores y frutos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		P.C. días	L.M.R. ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200LL	L/Ha		
TOMATE	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	0.5

P.C.: Período de carencia en días
L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad con un máximo de 3 aplicaciones por campaña

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola en el país e incompatibles con otros plaguicidas de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

Este producto no presenta ningún riesgo de fitotoxicidad, siempre y cuando se use a las dosis indicadas y en los momentos indicados. Tener en cuenta el tipo de mezcla con otros plaguicidas antes de aplicar sobre los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA