



ETIQUETA

Revisión: 07
Aprobado: JR
Fecha: 30-05-14
Página: 7 de 7

MAGISTRAL 50 EC - NOVA CROP PROTECTION CO. LTD

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión.
- Este producto es moderadamente irritante a la piel y ojos; puede causar sensibilidad cutánea.
- Ligeramente tóxico por inhalación.
- Evitar la exposición del producto en personas embarazadas. Riesgo teratogénico.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante la mezcla y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzoxilureas
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítase la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estado temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MAGISTRAL[®]
50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Lufenuron..... 50 g/L
Aditivos..... c.s.p.l.

Registro PQUA N° 166-SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300
Fax: (01) 617-3312 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

Importado, 8 South Lijuan Road, Jiangning - Dis.Nanjing 211100 China.
Envasado y Tel.f.: +86-25-52782915
Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 200 L

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAGISTRAL[®] 50 EC es un insecticida regulador del crecimiento que actúa inhibiendo la síntesis de quitina, ocasionando rompimiento y malformaciones durante la muda, causando finalmente la muerte de las larvas. Actúa principalmente por ingestión. Es más activo contra las larvas en los primeros estadios de desarrollo. También tiene efecto ovicida.

MAGISTRAL[®] 50 EC es utilizado en aspersión foliar. Se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

MAGISTRAL[®] 50 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tractoras, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegúrese que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (gras)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.5	14	0.1
	"Gusano perforador de frutos y vainas"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.5	7	0.02
ARVEJA	"Gusano de follaje"	<i>Capitarsia decolora</i>	0.15	0.45	7	0.02
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	7	0.02
MAÍZ	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	35	0.02
OLIVO	"Gusano del brote del olivo"	<i>Palpita persimilis</i>	0.25	0.75	5	0.01
PAPRIKA	"Gusano ejento"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	0.6	7	1
PIMIENTO	"Perforador de frutos"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.6	4	1

EC: Puntos de Control.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda una aplicación por campaña. La aplicación puede variar de acuerdo a la incidencia de la plaga y daño en el cultivo (realizar monitoreo), también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar el equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

MAGISTRAL[®] 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No existen reportes de fitotoxicidad debido a las bajas concentraciones usadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm

Envase: COEX

L. MAGISTRAL
PANTONE 877 C

L. SILVESTRE
T. LAVADO
PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA
L. MAGISTRAL
T. LAVADO
PANTONE 293 C

PIC. INFLAMABLE
PANTONE 199 C

TEXTO
P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE