

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

Este producto es nocivo por ingestión. No ingerir.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.

Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Neonicotinoide

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mupestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, no induzca el vómito. Si el paciente esta conciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0800-13-040/328-7398 Atención a las 24 horas.

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0-801-10200

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas: (01) 225 5951

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.

No aplicar en épocas de floración del cultivo.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**BRAWL® 35% SC**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRICOLA**

**Suspensión Concentrada – SC**

**Composición química:**

Imidacloprid.....350 g/L

Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1037 - SENASA

Titular del Registro: IPEH



Instituto Peruano del Espárrago  
y Hortalizas

**Importado y distribuido por:**

**INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS**

Calle 21 N°713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú

Teléfono: (01) 225 5951

www.ipeh.org.pe

Contenido Neto: **20 L**

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

**Formulado por:**

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750

Jinan, Shandong, China

+86-531-88875230

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada por IPEH



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

**BRAWL 35% SC** es un insecticida sistémico y translaminar que actúa por contacto e ingestión. Es absorbido por las raíces y las hojas en forma acropétala.

**BRAWL 35% SC** puede aplicarse con cualquier tipo de aspersión terrestre de alto o bajo volumen, con el volumen suficiente de agua para poder cubrir todo el follaje en forma uniforme, así mismo directo al suelo vía sistema de riego por goteo.

**PREPARACION DE LA MEZCLA**

Previo a la calibración del equipo de aplicación se debe calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar a fin de no tener remanentes después de la aplicación. Antes de su uso se recomienda agitar bien el producto, la preparación de la pre-mezcla se debe realizar en un recipiente pequeño diluyendo bien el producto, para luego agregarlo al tanque de aplicación y este acoplarlo al sistema de riego por goteo.

Realizar las aplicaciones en horarios donde no haya vientos fuertes, ni cuando el rocío de la mañana este presente.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

| Cultivo   | Plaga               |                          | Dosis<br>L/ha | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
|           | Nombre común        | Nombre científico        |               |                |              |
| Espárrago | Thrips              | <i>Thrips tabaci</i>     | 1.5           | 3              | 0.005        |
| Vid       | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus ficus</i> | 2.0           | 30             | 1.0          |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Espárrago: Realizar un máximo de 02 aplicaciones por campaña y 04 aplicaciones por año. Iniciar la aplicación cuando se observe los primeros síntomas o a la presencia de Thrips en grado 2 (01 a 05 thrips por brote) en el cultivo de espárrago.

Vid: Realizar un máximo de 02 aplicaciones por campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

