

AZOXIAGRIN 25SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Azoxistrobin 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N°:

Titular del registro:

AGRINOR S.A.C.

Jr. Matier 305 of. 301

San Borja, Lima

Tel.: 637 8185

Formulado por:

FENASOL S.A.

Uruguay

Importado y distribuido por:

N° Lote:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido
Neto:

5L

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es peligroso si es inhalado, evitar respirar nube de aspersión.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Strobilurin.
- Síntomas de intoxicación: Irritación dermal, ocular, vómitos, diarreas, tos, dificultades para respirar.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa Adjunta.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente agua, si la persona es capaz de deglutir.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca, retirar los lentes de contacto y continúe con el lavado; no administrar ningún medicamento sin la consulta de un médico.
- En caso de contaminación dermal: remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15-20 minutos incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial y trasladarlo a un centro médico.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 0801-10200

CISPROQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AZOXIAGRIN 25 SC es un fungicida sistémico y traslaminar, con acción preventiva, curativa y erradicante, usado para el control de *puccinia asparagi* en espárrago.

Azoxiagrín 25 SC actúa inhibiendo el proceso respiratorio del hongo, lo que le confiere la propiedad antiesporulante impidiendo el desarrollo inicial del micelio.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Azoxiagrín 25 SC se prepara disolviendo la cantidad recomendada en un recipiente hasta formar una pasta sin grumos. Volcar dicha pasta al tanque de la máquina y luego completar el volumen deseado manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento. Se puede aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cuadro de usos:

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.30-0.35	7	0.01

PC: Periodo de carencia.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en mg/kg

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar un primer tratamiento en forma preventiva y un segundo tratamiento a los 10 o 15 días según la presión de la enfermedad.

Máximo dos aplicaciones por campaña cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para su desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No presenta problemas de compatibilidad. Dado que no se conocen todos los productos con los que el usuario podría mezclarlo en especial con coadyuvantes, recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

