

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
  - Causa irritación moderada a los ojos; use protección ocular durante la mezcla y aplicación.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
  - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
  - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
  - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazoles
  - En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
  - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
  - En caso de contacto, quítese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
  - Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.
  - En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o CISPROQUIM: 080-050-847 o AGRYNOVA 2663828**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de los productos o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

# PALAMARRE-AG

## REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Uniconazole-p.....50 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

**Registro PQUA N° 1048 - SENASA**

#### TITULAR DEL REGISTRO:

**GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**  
Mz. 3 - Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo  
La Libertad, Perú -Telf: 044 - 273330.  
info@agrynova.com

#### FORMULADOR:

**SHANGHAI AGRYNOVA CO. LTD.**  
Room 2105, QD3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong  
Telf.: 00852-29738324, Fax: 00852-21159613  
info@shanghaiagrynova.com

#### IMPORTADOR:

**AGRYNOVA S.A.C**  
Av. Manuel Villarón 357, Urb. La Aurora, Miraflores.  
Lima-Perú. Telf.: (044) 289877 Nextel.: 831\*5780.  
ventas@agrynova.com, www.agrynova.com.



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido neto : **1 L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PALAMARRE-AG®** es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelina (hormonas responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de los futuros frutos cuajados de palta.

**PALAMARRE-AG®** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

#### CUADRO DE USO Y DOSIS:

| Cultivo                          | Modo de Acción                                                                                                                                                                                               | Dosis   |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                              | %       | L/Ha    |              |              |
| Palto<br><i>Persea americana</i> | Aplicar en la época de floración, cuando se tenga entre 40 a 50 % de flores.<br>En pulverizaciones de gotas finas en forma de lluvia o rocío, al follaje y direccionado a los brotes, sin llegar al chorreo. | 0.8-1.0 | 4.8-6.0 | 14           | 0.01         |

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Realizar 1 aplicación por campaña.
- Aplicar la menor dosis en árboles jóvenes, la mayor dosis en árboles de 5 años a más
- Como máximo aplicar 6.0 L/ha.
- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

#### PERIODO DE REINGRESO

-Puede reingresar al área tratada, 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**PALAMARRE-AG** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para el cultivo si se usa a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

*"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."*



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

