

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir el paciente al vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



# TIBENZOLE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L

Aditivos..... csp 1 L

**Registro PQUA N° 1047 - SENASA**

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**



**AGRO KLINGE S.A.**

Av. El Derby 254, Int. 306, Santiago de Surco,  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000.

**Formulador:**

**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

**Contenido  
Neto: 1L**

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventivo y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de alcahofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezclas con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	----	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	----	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Ver hoja Informativa.

**PERIODO DE REINGRESO:** Ver hoja Informativa.

**COMPATIBILIDAD:** Ver hoja Informativa.

**FITOTOXICIDAD:** Ver hoja Informativa.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

Ur: 080719 VZ

© Marca Registrada



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Altura Total 13.5 cm.