

13 cm

52 cm

53.4 cm

54.4 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A.: (01) 641 0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

TIBENZOLE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Tebuconazole 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1047 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AgroKlinge

A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000.

Formulador:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 4 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la “oidiosis” en los cultivos de alcachofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	---	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	“Mancha púrpura” “Roya”	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	---	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	“Oidiosis”	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	“Mancha negra de la hoja”	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 7 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

© Marca Registrada



1 cm