

52 cm  
53.4 cm  
54.4 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

**TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 6410000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# TIBENZOLE®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)**

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

**Reg. PQUA N° 1047 - SENASA**

**Formulador:**  
Meghamani Industries Ltd  
Block N°401 Village Chharodi.  
Ta-Sanad Dist- Ahmedabad-  
382 170. India

**Titular de Registro:**  
ADAMA Agriculture Perú S.A.  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

**Importador y Distribuidor:**  
AgroKlinge  
A member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**  
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de alcachofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	---	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	---	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 7 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Considerando una (01) campaña por año para los cultivos de vid, manzano, pimiento, espárrago, alcachofa y mandarina.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO

13 cm

1 cm

52 cm  
53.4 cm  
54.4 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

**TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 6410000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# TIBENZOLE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1047 - SENASA

**Formulador:**  
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd  
Room 10-6, Shidai Square, N°8,  
Lengjing Street, Ningbo  
315010, Zhejiang, PR China

**Titular de Registro:**  
ADAMA Agriculture Perú S.A.  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

**Importador y Distribuidor:**  
AgroKlinge  
A member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**  
Av. El Derby 254, Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de alcachofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	---	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	---	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 7 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Considerando una (01) campaña por año para los cultivos de vid, manzano, pimiento, espárrago, alcachofa y mandarina.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO

13 cm

1 cm

52 cm  
53.4 cm  
54.4 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

**TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 6410000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# TIBENZOLE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1047 - SENASA

**Formulador:**

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center, Shunhua  
Road 750#, Jinan, Shandong, China  
Telf: +86-531-88875230

**Titular de Registro:**

ADAMA Agriculture Perú S.A.  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

**Importador y Distribuidor:**

AgroKlinge  
A member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**

Av. El Derby 254, Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de alcachofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	---	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	---	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 7 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Considerando una (01) campaña por año para los cultivos de vid, manzano, pimiento, espárrago, alcachofa y mandarina.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



13 cm

1 cm

52 cm  
53.4 cm  
54.4 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Luego de una hora de ocurrido el vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

Nota al médico: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

**TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 6410000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# TIBENZOLE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

**COMPOSICIÓN:**

Tebuconazole..... 250 g/L  
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1047 - SENASA

**Formulador:**

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd  
N°23, Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Song Jiang District, Shanghai, China

**Importador y Distribuidor:**



**AGRO KLINGE S.A.**  
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

**Titular de Registro:**

**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

N° de Lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TIBENZOLE® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de alcachofa, manzano, pimiento y vid. TIBENZOLE® se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	---	150-200	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura" "Roya"	<i>Stemphylium vesicarium</i> <i>Puccinia asparagi</i>	---	150-200 100-150	21	0.05
MANZANO	"Oidiosis"	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.30-0.75	80-100	21	0.5
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.40-0.50	200-250	7	0.5
VID	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30-0.75	60-100	14	2
MANDARINA	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	---	200	7	5

L.M.R.= Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 7 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Considerando una (01) campaña por año para los cultivos de vid, manzano, pimiento, espárrago, alcachofa y mandarina.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO

13 cm

1 cm