28.9 cm

14 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo Químico: Neonicotinoide.
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
-Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.
Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 4118000
anexo 4, Agro Klinge S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo ó perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los deshechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivos..... csp 1/L

Reg. PQUA Nº 1051-SENASA

Titular del Registro e Importador:
AgroKlinge
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565 / R.U.C. Nº 20508704217

Distribuido por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ate. Lima-Perú.
Telef.: 612-6565, Fax: 348-1020

Formulado por:
Ningbo Generic Chemicals Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, Nº 8,
Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Lote Nº
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1L

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. **NEOKLIN** es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos.
APLICACIONES FOLIARES: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Foliar ml/cil 200 L	Drench L/ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	*Bemisia tabaci* *Prodiplosis longifila*	100-150 150-200	0,75 ---	7-23	0,5
ALGODÓN	"Pulgón"	*Aphis gossypii*	75-120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	*Toxoptera aurantii*	100-150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips" "Mosquilla de los brotes"	*Thrips tabaci* *Prodiplosis longifila*	150-200 150-200	1,5 1,5	7	0.05
PALTO	"Queresa del Palto"	*Fiorinia fioriniae*	150-200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	*Tagosode oryzicolus*	75-100	---	21	1,5
CEBOLLA	"Trips"	*Thrips tabaci*	200	---	21	0,05

P.C.= Período de carencia **L.M.R. = Límite máximo de residuos**

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año.
PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

28 cm

0.5 cm

27 cm

0.5 cm 0.9 cm