

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1051-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro klinge S.A.
 Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

Iprochem Company Limited
 35F, Guomao Business Mansion,
 3005 Nanhu Rd., Luohu District
 Shenzhen, China

Titular de registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. NEOKLIN es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos. **APLICACIONES FOLIARES:** Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje. **APLICACIONES EN "DRENCH":** Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Foliar m ² /200 L	Drench L/Ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 150 150 - 200	0.75 ---	7 - 23	0.5
ALGODÓN	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	75 - 120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100 - 150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	1.5	7	0.05
PALTO	"Querasas del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	150 - 200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosode oryzicolus</i>	75 - 100	---	21	1.5
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	---	21	0.1

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año, considerando una (01) campaña para mandarina, palto, tomate y algodón; y dos (02) campañas para espárrago, cebolla y arroz, por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



28 cm

27 cm

0.5 cm

0.5 cm 0.9 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1051-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro klinge S.A.
 Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co, Ltd
 Room 10-6, Shidai Square, N°8
 Lengjing Street,
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Titular de registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. NEOKLIN es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos.
APLICACIONES FOLIARES: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Foliar m/200 L	Drench L/Ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 150 150 - 200	0.75 ---	7 - 23	0.5
ALGODÓN	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	75 - 120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100 - 150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	1.5	7	0.05
PALTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplaxis longifila</i>				
PALTO	"Queresas del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	150 - 200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosode oryzicolus</i>	75 - 100	---	21	1.5
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	---	21	0.1

P.C. = Periodo de carencia

L.M.R. = Limite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año, considerando una (01) campaña para mandarina, palto, tomate y algodón; y dos (02) campañas para espárrago, cebolla y arroz, por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



28 cm

27 cm

0.5 cm

0.5 cm 0.9 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1051-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro klinge S.A.
 Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
 6th Floor, Gaixinjishuchuangye Center, Shunhua Road 750#, Jinan, Shandong, China

Titular de registro:
 ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. NEOKLIN es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos.
APLICACIONES FOLIARES: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Foliar m ² /200 L	Drench L/Ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 150 150 - 200	0.75 ---	7 - 23	0.5
ALGODÓN	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	75 - 120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100 - 150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	1.5	7	0.05
PALTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplaxis longifila</i>				
PALTO	"Queresas del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	150 - 200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosode oryzicolus</i>	75 - 100	---	21	1.5
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	---	21	0.1

P.C. = Periodo de carencia

L.M.R. = Limite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año, considerando una (01) campaña para mandarina, palto, tomate y algodón; y dos (02) campañas para espárrago, cebolla y arroz, por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



28 cm

27 cm

0.5 cm

0.5 cm 0.9 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1051-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro klinge S.A.
 Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd
 N°23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
 Song Jiang District, Shanghai, China

Titular de registro:
 ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. NEOKLIN es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos.
APLICACIONES FOLIARES: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Foliar m ² /200 L	Drench L/Ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 150 150 - 200	0.75 ---	7 - 23	0.5
ALGODÓN	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	75 - 120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100 - 150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	1.5	7	0.05
PALTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplaxis longifila</i>				
PALTO	"Queresas del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	150 - 200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosode oryzicolus</i>	75 - 100	---	21	1.5
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	---	21	0.1

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año, considerando una (01) campaña para mandarina, palto, tomate y algodón; y dos (02) campañas para espárrago, cebolla y arroz, por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



28 cm

27 cm

0.5 cm

0.5 cm 0.9 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca registrada

NEOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1051-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro klinge S.A.
 Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:
Shanghai Mio Chemical Co., Ltd
 Room A305, N° 508 Chungong Road, Xinzhuang Industrial Park, Minhang District, Shanghai 201108, China

Titular de registro:
 ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
 Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
 Telf.: (01) 641-0000

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: NEOKLIN es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. NEOKLIN es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta y raíces. Controla las plagas señaladas en el cuadro de usos.
APLICACIONES FOLIARES: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.
APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Foliar m ² /200 L	Drench L/Ha		
TOMATE	"Mosca blanca" "Caracha"	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100 - 150 150 - 200	0.75 ---	7 - 23	0.5
ALGODÓN	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	75 - 120	---	7	3
MANDARINO	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100 - 150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200	1.5	7	0.05
PALTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplaxis longifila</i>				
PALTO	"Queresas del palto"	<i>Fiorinia floriniae</i>	150 - 200	---	7	1
ARROZ	"Sogata"	<i>Tagosode oryzicolus</i>	75 - 100	---	21	1.5
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200	---	21	0.1

P.C. = Periodo de carencia

L.M.R. = Limite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año, considerando una (01) campaña para mandarina, palto, tomate y algodón; y dos (02) campañas para espárrago, cebolla y arroz, por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

