

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC : 478-2002  
CISPROQUIM: 0800-5-0847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO  | PLAGA         |                               | DOSIS      |            |              | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)  |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|
|          | Nombre Común  | Nombre Científico             | kg/200 L   | kg /ha     | %            |                |               |
| Cebolla  | Punta seca    | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -          | 0.3 - 0.5  | -            | 14             | 0.02          |
| Vid      | Oidium        | <i>Erysiphe necator</i>       | -          | 0.3        | 0.03         | 21             | 2.0*          |
|          | Moho gris     | <i>Botrytis cinerea</i>       | -          | 0.3 - 0.35 | 0.03 - 0.035 |                | 5.0**         |
| Arroz    | Pyricularia   | <i>Pyricularia oryzae</i>     | -          | 0.2 - 0.25 | -            | 35             | 0.02          |
| Café     | Roya del café | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 0.2        | -          | -            | 30             | 0.1*          |
|          | Ojo de gallo  | <i>Mycena citricolor</i>      | 0.15 - 0.2 | -          | -            | 30             | 0.05**        |
| Pimiento | Oidium        | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.125      | 0.25       | -            | 7              | 0.5*<br>0.3** |

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenacia

\*Tebuconazole \*\*Trifloxystrobin

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ETNICO 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Número máximo de aplicaciones:  
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.  
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.  
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.

No aplicar ETNICO 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

#### FITOTOXICIDAD

El producto **ETNICO 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# ETNICO

## 75 WG

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULO DISPERSABLE - WG**

#### COMPOSICIÓN:

Tebuconazole \_\_\_\_\_ 500 g/kg  
Trifloxystrobin \_\_\_\_\_ 250 g/kg  
Aditivos \_\_\_\_\_ c.s.p. 1kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC**

Importado y Distribuido por:

**BIOAGROCORP TRADING SAC**



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita

Teléfono: 478-2002 362-0102 / Fax: 362-0014

N° Lote :

F. de Form.:

F. de Venc.:

**Contenido neto: 100 g.**

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

