

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, leve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estuarios, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETNICO 75 WG, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifoxystrobin inhibe la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
ETNICO 75 WG, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua para probar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con pH entre 5.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional teniendo en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga.
En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de crecimiento del bulbo.
En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de brotes verdes afectados.
En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de panícula.
En Café: para el control de Ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El resto de agua es de 200 L/Ha.
- Número máximo de aplicaciones:
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 a 14 días, considerando 2 campañas al año.
- No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO
Evitar reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de acción fuertemente ácidos, alcalinos u oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, pueden ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Podredumbre	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
	Botrytis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Arroz	Fiticularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Hoya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15-0.2	-	-	-	0.05**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	2.5*
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	2.5*

P.C.: Dosis de curación (días) L.M.R.: Límite máximo de residuo (ppm) Partes por millón *Tebuconazole **Trifoxystrobin



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ETNICO 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Tebuconazole 500 g/Kg
Trifoxystrobin 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 1056 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 680 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 100 gr.
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, leve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido vacíe la funda o bolsa contenedora. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estuarios, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETNICO 75 WG, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifoxystrobin interfiere la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

ETNICO 75 WG, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua agregar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 5.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional teniendo en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.

En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de crecimiento del bulbo.

En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de hojas afectadas.

En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de panícula.

En Café: para el control de Ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El pH de agua es de 200 L/Ha.

- Número máximo de aplicaciones:
En Cebolla: aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.

En Arroz: aplicar 02 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, considerando 2 campañas al año.

- No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente ácidos, alcalinos u oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, pueden ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Pudrición	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
	Botrytis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Arroz	Fusarium	<i>Fusarium oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
	Ojo de gallo	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30	0.1*
Café	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15-0.2	-	-	7	0.05*
	Ojo de gallo	<i>Leveillula leucovirgata</i>	0.125	0.25	-	7	2.5*, 2.5**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula leucovirgata</i>	0.125	0.25	-	7	2.5*, 2.5**

P.C: Período de carencia (días) L.M.R: Límite máximo de residuo (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifoxystrobin



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ETNICO 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE WG

Composición:
Tebuconazole 500 g/Kg
Trifoxystrobin 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 1056 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 100 gr.
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

