

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, lávese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área.
- Tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazol + Estrobilina

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido incline la funda o bolsa contaminada. Entreguela o deposítala en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 40 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales, ríos, subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para proteger la salud.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO*

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Botrytis	Stemphylium vesicarium	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
	Oidium	Erysiphe necator	-	0.3	0.03	21	2.0*
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	-	0.3 - 0.36	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
	Roya del café	Hemileia vastatrix	0.2	-	-	30	0.1*
Café	Ojo de gallo	Mycena citricolor	0.15 - 0.2	-	-	-	0.05**
	Oidium	Leveillula taurica	0.125	0.25	-	7	0.3**

*Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETNICO 75 WG, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.

ETNICO 75 WG, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional, siempre en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
- En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
- En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la etapa de racolamiento y formación de panícula.
- En Café: para el control de la roya, aplicar, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua es de 200 L/Ha.
- Número máximo de aplicaciones:
 - En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
 - En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
 - En Arroz: máximo aplicar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días; considerando 2 campañas al año.
- No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

Debe ingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente ácidos, alcalinos u oxidante.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular de registro.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**ETNICO
75 WG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Tebuconazole 500 g/Kg
Trifloxystrobin 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 1056 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 250 gr

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu. 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, lávese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área.
- Tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazol + Estrobilina**
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contaminada. Entreguela o deposítala en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismo.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/Ha	%		
Cebolla	Botrytis	Stemphylium vesicarium	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
	Oídio	Erysiphe necator	-	0.3	0.03	21	2.0*
Vid	Mocho gris	Botrytis cinerea	-	0.3 - 0.36	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Piricularia	Piricularia oryzae	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del café	Hemileia vastatrix	0.2	-	-	30	0.1*
	Ojo de gallo	Mycena citricolor	0.15 - 0.2	-	-	-	0.05**
Pimiento	Oídio	Leveillula taurica	0.125	0.25	-	7	0.5*

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- ETNICO 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- ETNICO 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, formando una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional, cuando el buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- En Cebolla: cuando se encuentre en campo 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
- En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
- En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de crecimiento y formación de panícula.
- En Café: para el control de ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua debe ser 200 L/Ha.
- Número máximo de aplicaciones:
 - En Cebolla: máximo 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
 - En Vid: máximo 01 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de agua de 1000 litros por hectárea.
 - En Arroz: máximo 02 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días; considerando 2 campañas al año.
- No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente ácidos, alcalinos u oxidante.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular de registro.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ETNICO 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición: 500 g/Kg
Tebuconazole250 g/Kg
Trifloxystrobin c.s.p 1Kg
Aditivos

Reg PQUA N° 1056 SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:
Nº de Lote: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
Contenido Neto: 250 g N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Fecha de Vencimiento: Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

