

18.0 cm

15 cm

4.5 cm

15 cm

4.5 cm

ETNICO 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:
 Tebuconazole 500 g/Kg
 Trifloxystrobin 250 g/Kg
 Aditivos c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 1056 - SENASA
 Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
 Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:
 Nº de Lote: **NANJING RHONQUIM CO., LTD**
 Contenido Neto: 250 gr. Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
 Fecha de Vencimiento: CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 - Este producto es de cuidado, no ingerir.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
 - **Grupo químico: Triazol + Estrobilina**
 - En caso de intoxicación, leve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 SAMU: 106
 CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 - Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
 - **ETNICO 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
 - **ETNICO 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
 - Aplicar previa evaluación de la plaga.
 En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
 En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
 En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de sacollamiento y formación de panícula.
 En Café: para el control de Ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua es de 200 L/ha.
 • Número máximo de aplicaciones:
 En Cebolla: máximo aplicar 02 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
 En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
 En Arroz: máximo aplicar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días, considerando 2 campañas al año.
 - No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE RENGRESO
 Puede ingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

FITOTOXICIDAD
 La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
 El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Cebolla	Bunta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14
Vid	Chidm	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	5.0*
Arroz	Piricularia	<i>Piricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35
Café	Roya del café	<i>Hemiteia vastatrix</i>	0.2	-	-	30
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	0.05**
Plátano	Chidm	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7

* Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin



18.0 cm

15 cm

4.5 cm

15 cm

4.5 cm

ETNICO 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:
Tebuconazole 500 g/Kg
Trifloxystrobin 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1Kg

Reg PQUA N° 1056 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:
N° de Lote: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
Contenido Neto: 250 gr. N° 23, Lane 5398, Shenzhen Road
Fecha de Vencimiento: Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Triazol + Estrobirulina**
- En caso de intoxicación, leve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ETNICO 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- **ETNICO 75 WG**, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional siempre en buen estado y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- En Cebolla: cuando se encuentre en campo 50% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
- En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
- En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la etapa de germinación y formación de panícula.
- En Café: para el control de O de gajo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua debe ser 200 L/ha.
- Número máximo de aplicaciones:
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
En Vid: máximo aplicar 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.
- No aplicar **ETNICO 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE RENOVOS

Período de renovar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETNICO 75 WG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Cebolla	Plaga seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	5.0**
Arroz	Piricularia	<i>Piricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	0.05**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón) *Tebuconazole **Trifloxystrobin

