

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**En caso de contacto con los ojos** lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.  
**En caso de ingestión** dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**  
**L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC:**  
**(511) 382-4874**

**MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:**

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# REGALIA MAXX

**EXTRACTO VEGETAL**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición:**  
 Extracto de *Reynoutria sachalinensis*.....244.0 g/L  
 Aditivos.....c.p.s. 1 L

Reg. PBUA N° 0298 - SENASA

**Titular del Registro:**  
**L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC**  
 Av. Javier Prado Este 488 Piso 9. San Isidro. Lima, Perú.  
 Teléfono: (511) 382-4874. seragro@seragro.net.

**Formulador:**  
**Marrone Bio Innovations Inc.**  
 2121 Second St. Suite B-107, Davis  
 CA95618 USA

**Importado y distribuido por:**  
**AGROVECA PERÚ S.A.C.**  
 Av. Dionisio N° 184, Oficina 603  
 San Isidro-Lima, Perú.  
 Teléfono: +511 422-8989.  
 contacto@agroveca.com.pe



**Contenido Neto: 1 L**

N° de Lote  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**REGALIA MAXX** es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fenólicos. Utilice **REGALIA MAXX** como tratamiento preventivo.  
 Para aplicar este producto no se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva.  
 Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme.  
 Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizado manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Nombre de la plaga		Dosis L/ha	Dosis L/cil.	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	N. Comun	N. Científico				
Palto	Cladosporium	Cladosporium cladosporioides		0.3	NA	NA
Vid	Oidium	Erysiphe necator	1.2 - 1.5		NA	NA
Quinoa	Mildiu	Peronospora farinosa		0.7	NA	NA
Vid	Mildiu de la vid	Plasmopara viticola	1.2 - 1.5		NA	NA
Pimiento	Oidiosis	Leveillula taurica	1.25 - 1.5		NA	NA
Arándano	Putrición gris	Botrytis cinerea	1.25		NA	NA

P.C.: Periodo de carencia en días  
 NA.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **REGALIA MAXX** preventivamente o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con un intervalo de 7 a 14 días.

Arándano: Aplicar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año.  
 Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación, considerar que el campo a tratar debe estar manejado bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbo manual. Eliminación de desechos de la post cosecha y combate biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones del cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** reingresar una vez que el producto se haya secado  
**COMPATIBILIDAD:** No pre mezclar **REGALIA MAXX** con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**

