

28,00 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Este producto es nocivo por contacto.  
Causa daño temporal a los ojos.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
Utilice ropa protectora durante el manejo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
No re envasar o depositar el contenido en otros envases.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Triazoles.  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.  
Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.  
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.  
En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario. Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

**CICOTOX:** 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / **ESSALUD:** 117 (gratuito)  
**CISPROQUIM:** 0801-050-847 / **ANTALIEN SAC:** (01) 445-7352

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# SINODIFE® 250 EC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**Concentrado emulsionable – EC**

**Composición Química:**

Difenoconazole.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Registro PQUA Nº 820 - SENASA  
Titular del Registro: ANTALIEN SAC**



**Importado y distribuido por:  
ANTALIEN SAC**

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima  
Teléfono: (01) 445-7352

**Contenido Neto: 1L**

Formulado por:

Nº Lote: JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION  
F. de Form: 15 Hubu Street Nanjing, 210002, China  
F. de Venc: Teléfono: +86 25 86895000 / Fax: +86 25 84400800

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SINODIFE® 250 SC** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de "Roya" *Puccinia asparagi* en el cultivo de espárrago.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Verter la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.  
**SINODIFE® 250 EC** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USOS Y DOSIS**

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Esparrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0,50 - 0,65 L/ha	21	0,03

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar cuando las condiciones agroecológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:**

**SINODIFE® 250 EC** en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:**

**SINODIFE® 250 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



14,60 cm