

15 cm

15 cm

FOSTAR®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Flumorph 50 g/Kg
Fosetyl Aluminium 450 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

PQUA N° 1061 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia St.,
Ningbo 315000. China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con el polvo o la aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Morfolina (Flumorph) y Phosphonate (Fosetyl aluminium)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de intoxicación por inhalación remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario.

En caso de intoxicación por ingestión lavar los residuos remanentes en la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia.

En caso de contacto con la piel o ropa, lavar con abundante agua de 15 a 20 minutos, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos y consulte a un médico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Flumorph es un fungicida protectante, curativo y con actividad antiesporulante.

Fosetyl aluminium es un fungicida sistémico de rápida absorción a través de la planta, hojas y raíces. Con translocación acropetal y basipetal.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **FOSTAR®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **FOSTAR®** cuando se note la presencia de la enfermedad en el campo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña del cultivo por año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es incompatible con fertilizantes foliares. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L		
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	"Mildiu"	<i>Peronospora cubensis</i>	0.8 - 1.0	7	2.0 ⁽¹⁾ 75.0 ⁽²⁾
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (Rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.7 - 0.9	14	0.50 ⁽¹⁾ 30.0 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuos

(1)Flumorph, (2)Fosetyl Aluminium



23 cm

3.4 cm