

14.8 cm

14.8 cm

19.9 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Lambda cyhalothrin : 100 g/kg
Emamectin benzoato : 50 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1067 - SENASA



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg (10 sobres de 100 g)
N° de Lote: F. de Form: F. de Venc:

Formulado por:
JIANGSU AJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
No.58 Shuangxiang Road, Hongshan
Fine-Chemical Zone, Nanjing 211511,
China.

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Emamectin-benzoate; Avermectin; Lambda-cyhalothrin; Piretroide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAZON® 150 WP es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoate (insecticida no sistémico, de contacto e ingestión con efecto translaminar) y Lambda-cyhalothrin (insecticida de contacto e ingestión, con acción residual y repelente). **MAZON® 150 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/ha		
ALCACHOFA	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	100-200	-	14	0.5 (a), 0.02 (b)
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	100-200	-	14	0.01 (a), 0.02 (b)
ARÁNDANO	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	100-200	-	14	0.01 (a), 0.02 (b)
	Novia del arroz	<i>Rupelia albiniella</i>	100-200	-	21	0.01 (a), 1.0 (b)
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	-	30	0.01 (a), 0.01 (b)
	Langosta migratoria	<i>Schistocerca gregaria</i>	100-200	-	7	0.1 (a), 0.1 (b)
FRIJOL	Langosta migratoria	<i>Schistocerca gregaria</i>	100-200	-	30	0.01 (a), 0.05 (b)
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-200	-	21	0.01 (a), 0.05 (b)
MAÍZ	Langosta migratoria	<i>Schistocerca gregaria</i>	100-200	-	30	0.01 (a), 0.05 (b)
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-200	-	21	0.01 (a), 0.05 (b)
PALTO	Falso medidor	<i>Oxydia vesulia</i>	100-200	-	-	-
	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>	100	-	7	0.02 (a), 0.05 (b)
PIMIENTO	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>	100	-	7	0.02 (a), 0.1 (b)
	Minador de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	100-200	-	7	0.02 (a), 0.1 (b)
TOMATE	Minador de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	100-200	-	7	0.02 (a), 0.1 (b)
	Caballada (gusano ejerte)	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	-	15	0.05 (a), 0.08 (b)

P.C.: Período de Carenza L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(a) Emamectin benzoate (b) Lambda-cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar como máximo 1 aplicación de **MAZON® 150 WP** (i.e. Emamectin benzoate + Lambda-cyhalothrin) por campaña, considerando 2 campañas al año. Iniciar la aplicación al observar los primeros indicios de plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico. Para el cultivo de vid, se recomienda 01 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: **MAZON® 150 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, productos fuertemente alcalinos, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

2.9 cm

