

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es mortal si se ingiere y muy peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Derivados de la glicina
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398** **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**  
**Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117 (gratuito) CIPROSQUIM: 0800-5-0847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# IGNUS

## 480 SL

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**Composición:**

Glyphosate en forma de sal isopropilamina ..... 480 g/L  
(equivalente a 360 g/L glifosato ácido)

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**

Importado y distribuido por:  
**BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 Santa Anita  
Teléfono: 478-2002 Fax: 362-0014

**Contenido neto: 20 L**

**N° de Lote:**

**F. de Form.:**

**F. de Venc.:**

Formulado por:

YINXING XINGNONG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD  
Wanshi Town, Yixing, Jiangsu Province  
CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**IGNUS 480 SL** es un herbicida sistémico, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para formar proteínas estructurales y metabolitos esenciales en el desarrollo de las malezas.

**IGNUS 480 SL** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGA           |                            | DOSIS     |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|           | NOMBRE COMÚN    | NOMBRE TÉCNICO             | L/200 L   | L/Ha      |                |                 |
| Mandarina | Verdolaga       | <i>Portulaca oleracea</i>  | 3.0       | 6.0       | 1              | 0.5             |
|           | Capulí cimarrón | <i>Nycandra physalodes</i> |           |           |                |                 |
|           | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>    |           |           |                |                 |
|           | Chamico         | <i>Datura stramonium</i>   |           |           |                |                 |
| Pimiento  | Verdolaga       | <i>Portulaca oleracea</i>  | 1.5 - 2.0 | 3.0 - 4.0 | 14             | 0.1             |
|           | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i>     |           |           |                |                 |
|           | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>    |           |           |                |                 |
|           | Yuyo            | <i>Amaranthus dubius</i>   |           |           |                |                 |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximo de residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

- Aplicar a siempre en postemergencia sobre las malezas, siempre y cuando estas se encuentren expuestas al contacto con el herbicida.
- En Mandarina aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 1 campaña/año, aplicar sobre la zona de goteo y entre las calles.
- En Pimiento aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 2 campañas/año, aplicar 3 días antes de la siembra o trasplante al campo definitivo.
- Como máximo aplicar 4.0 L/Ha. en Pimiento y 6.0 L/Ha. en Mandarina.
- En caso se requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **IGNUS 480 SL** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, ácidos u oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** **IGNUS 480 SL** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

