

PENTAFLORO FARMEX®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Pentacloronitrobenzeno.....750 g/kg
Aditivos.....c.s.p.....1 kg

Reg. N° 443-97-AG-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.



Formulado y distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27
Teléfono: 630-6400, Fax: 630-6410

Contenido neto: 1 Kilogramo

Lote N°:

F. Fab.:

F. Venc.:

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Use sólo las dosis recomendadas.
 - Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
 - No debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
 - Use máscara apropiada para polvos y tenga zapatos, guantes y ropa que se use solamente en el trabajo.
 - No trate de destapar las boquillas de las aspersoras o los tubos de las espolvoreadoras con la boca.
 - Después de terminar la aplicación cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón.
 - Maneje con cuidado los envases evitando roturas.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Derivado de chlorophenyl/nitroanilino.
 - En el caso de ingestión involuntaria o intoxicación, se deberá eliminar el producto del tubo digestivo, provocando vómito administrando agua salada caliente y abundante líquido.
 - En el caso de Cianosis o Disnea llamar al médico.
 - Nota al médico: **PENTAFLORO FARMEX®** es un fungicida clorado que no tiene antídoto específico. La terapia consiste en dar una solución de bicarbonato de sodio al 5% (100 ml cada 30 min). Otra alternativa es administrar cada 15 minutos 2.5 g de nitrato de sodio + 2.5 g de bicarbonato sódico, hasta lograr orina alcalina.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita),
FARMEX S.A. 630-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Restringir el uso a zonas de cultivo; no aplicar cerca de vegetación ribereña, áreas protegidas o de hábitat silvestre.
- Este producto es altamente tóxico para peces. No aplicar cerca de fuentes de agua donde habitan estos organismos: piscigranjas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, puquiales, humedales, manglares, bofedales, riberas y playas.
- Luego de su aplicación no realizar riegos pesados. Antes y durante la aplicación mantener tapado el cilindro de aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PENTAFLORO FARMEX® es un compuesto orgánico empleado para prevenir algunas enfermedades producidas por hongos que habitan en el suelo o son transmitidas por semillas, según se indica en la etiqueta.

Tiene una alta estabilidad en cualquier tipo de suelo y actúa bien sobre hongos que se desarrollan a baja temperatura y alta humedad. **PENTAFLORO FARMEX®** puede ser aplicado en las siguientes formas:

1. Al suelo directamente

- a) En espolvoreo al fondo del surco poco antes de la siembra y tal como viene el producto.
- b) En pulverización al fondo del surco, incorporándolo inmediatamente. Diluir previamente la dosis en un balde de 8 litros y luego completar hasta llegar al volumen final de aplicación.

2. Desinfección directa de las semillas

- a) En forma de polvo seco, tal como viene el producto.
- b) En forma de pasta diluida para lo cual se diluye la dosis recomendada en 1 o 2 litros de agua y se mezclan las semillas con la pasta preparada.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN. En todos los cultivos recomendados, **PENTAFLORO FARMEX®** sólo se aplica una vez por campaña. El momento de aplicación es previo o durante la siembra, ya sea en tratamiento de semilla o aplicación al fondo del surco

PERIODO DE REINGRESO. No reingresar hasta 12 horas luego de la aplicación. Tampoco permitir el ingreso del ganado.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD. **PENTAFLORO FARMEX®** utilizado a las dosis recomendadas, no ha causado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos ensayados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Enfermedad		Dosis	Forma de aplicación	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodonero	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	400 – 500 g/46 kg de semilla	Desinfección directa en polvo o pasta	0,1
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1,2 kg/ 1000 kg de semilla ó 4-5 kg/ha	Sumersión de semilla En pulverización al fondo del surco con los tubérculos depositados	0,1
Ajo	Pudrición blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	1,5 kg/ 100 kg de dientes ó 11-12 kg/ha	Desinfección en espolvoreo En espolvoreo al fondo del surco	0,1
Cebolla	Pudredumbre del cuello	<i>Botrytis allii</i>	0,2 kg/kg de semilla	Desinfección de semilla	0,1
Frijol	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	4-5 kg/ha	Pulverización al fondo del surco	0,1
Haba	Pudrición blanca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	4-5 kg/ha	Pulverización al fondo del surco y cuello de las plantas.	0,1

L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón.