

17 x 25 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CROSS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS SOLUBLES (SG)**

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoate ..... 50 g/Kg

Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

**Registro PQUA N° 1072 - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**AGREVO PERUANA S.A.C.**

Jr. San Sebastián 298,

Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú Teléfono: (01) 6328482



**Formulador:**

**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**

29 F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing

**CHINA**

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Contenido neto: 500 g**

**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

17 x 25 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o aspersión.
- Puede causar irritación a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (sombrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No contaminar aguas, alimentos o forrajes. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forrajes del área recién tratada.
- Tóxico para peces.
- Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada.
- Tóxico para abejas. "Tóxico para abejas expuestas a la aspersión directa. No se debe aplicar en época de floración". Si se encuentran panales cercanos se recomienda cubrirlos durante la aplicación del producto. No aplicar los productos cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo. Las aplicaciones al fin de la tarde o en la noche son menos dañinas para las abejas. No aplique los productos cuando las plantas están en floración a menos que sea completamente necesario. Evitar la deriva del pesticida hacia colmenas o áreas donde hay cultivos o plantas salvajes floreciendo. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Avermectinas. Insecticida de origen natural, derivado de la fermentación del microorganismo *Streptomyces avermitilis*.
- En caso de sospechar una intoxicación, detener el trabajo y llamar inmediatamente al médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios. En caso de inhalación, llevar al afectado a un área bien ventilada.
- En caso de contacto con la piel o ropa, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico si persisten las molestias.
- En caso de ingestión, llamar de inmediato a un médico y llevar la etiqueta del producto. No inducir al vómito. Mantener al afectado abrigado en reposo. No administrar nada por vía oral a un paciente que esté inconsciente y mantenerlo acostado de lado.

**Antídoto:**

- No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106**

**AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Tóxico para abejas.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CROSS**, insecticida, familia de productos avermectinas. larvicida, de origen natural, con poderosa actividad translaminar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros y otros como minadores foliares. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos.

**CROSS**, se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA                                  |                     | DOSIS<br>g./ha. | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                           | Nombre técnico      |                 |                |                 |
| ESPÁRRAGO | Gusano ejército                        | Spodoptera eridanea | 200             | 7              | 0.5             |
| PIMIENTO  | Gusano perforador grande de la bellota | Heliothis virescens | 150             | 1              | 0.2             |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm).

**P.C.:** Periodo de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 01(una) aplicación por campaña/año cuando se observe las primeras larvas en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas, después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con plaguicidas de uso común.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

